

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 4,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 16 (29 de
diciembre de 2019 al 18 de abril) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018, 2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1-16

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020



Tabla de contenido


- 1. *Intento de suicidio*.....04
- 1.1. *Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16*.....04
- 1.2. *Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 16*.....04
- 1.3. *Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia*.....05
- 1.4. *Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020*..... 06
- 1.5. *Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio*..... 06
- 1.6. *Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020*..... 08
- 1.7. *Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020*..... 08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 16.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 16 se notificaron a Sivigila 101 casos, para el año 2019 se notificaron 107 casos y para el año 2020 se han notificado 91 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 6 y la tendencia durante este año es a la disminución del número de los casos. Se observó una disminución del 15,0% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 16, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2017 a 2020 hasta semana epidemiológica 16.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 16, los municipios de Mocoa y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Villagarzón, Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los municipios de San Francisco, Puerto Asís, Leguízamo, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Santiago, Colón y San Miguel se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2017 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 16

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTÓRICO 2017-2019	OBSERVADO
MOCOA	17	19
PUERTO ASIS	19	16
VALLE DEL GUAMUEZ	11	10
VILLAGARZÓN	9	9
LEGUÍZAMO	6	11
ORITO	10	14
SAN MIGUEL	6	3
SIBUNDOY	4	6
PUERTO GUZMÁN	4	4
PUERTO CAICEDO	6	9
SANTIAGO	2	3
COLON	3	1
SAN FRANCISCO	2	2
PUTUMAYO	100	107

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16 de 2017 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 16, el primer lugar lo ocupa el municipio de Mocoa con 25,3% de los casos, seguido de Puerto Asís con 22,0 % de los casos, Valle del Guamuéz y Leguízamo con 9,9% de los casos cada uno, Sibundoy con 8,8% de los casos, San Miguel con 5,5% de los casos, Orito y Puerto Caicedo con 4,4% de los casos cada uno, Santiago y Colón con 2,2% de los casos cada uno, Puerto Guzmán, San Francisco y Villagarzón con 1,1% de los casos cada uno. Los demás municipios no presentaron casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 16, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
MOCOA	23	25,3
PUERTO ASIS	20	22,0
VALLE DEL GUAMUEZ	9	9,9
LEGUÍZAMO	9	9,9


SIBUNDOY	8	8,8
SAN MIGUEL	5	5,5
ORITO	4	4,4
PUERTO CAICEDO	4	4,4
SANTIAGO	2	2,2
COLON	2	2,2
VILLAGARZÓN	1	1,1
SAN FRANCISCO	1	1,1
PUERTO GUZMÁN	1	1,1
OTRO DEPTO.	2	2,2
Total general	91	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 16, la presentó **Sibundoy** con 51,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Mocoa** con 39,0 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 36,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Leguízamo** con 30,5% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 29,8% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Santiago** con 27,4% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Valle del Guamuez** con 26,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Miguel** con 25,7% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Puerto Caicedo** con 25,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de 24,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es Puerto Guzmán con 2,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de 16,2 casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16- 2020

1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de régimen de excepción y no asegurado. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 16, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	54	59,3
	MASCULINO	37	40,7
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	61	67,0
	CENTRO POBLADO	6	6,6
	RURAL DISPERSA	24	26,4
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	75	82,4
	CONTRIBUTIVO	3	3,3
	NO ASEGURADO	6	6,6
	EXCEPCIÓN	6	6,6
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	1,1
PERTENENCIA ÉTNICA	OTROS	80	87,9
	INDÍGENA	8	8,8
	AFROCOLOMBIANO	2	2,2
	ROM GITANO	1	1,1
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	0	0,0
	10-14	14	15,4
	15-19	28	30,8
	20-24	16	17,6
	25-29	11	12,1
	30-34	7	7,7
	35-39	3	3,3
	40-44	5	5,5
	45-49	2	2,2
	50-54	3	3,3
	55-59	1	1,1
60-64	0	0,0	



	65-69	1	1,1
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
	85-89	0	0,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 91 casos notificados, el 36,3 (33 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 63,7% (58 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 18 casos (54,5%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	18	54,5
2 veces	10	30,3
3 veces	3	9,1
Más de 3 veces	1	3,0
Desconocido	1	3,0
Total con intento	33	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 91 casos notificados, el 70,3% (64 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 25,3 % (23 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma cortopunzante, el 3,3 % (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento y el 1,1% (1 caso) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento a vehículo, los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 64 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (33 casos), seguidos de medicamentos (26 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-16, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 16- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD