

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 5,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 20 (29 de
diciembre de 2019 al 16 de mayo) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018, 2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1-20

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020



Tabla de contenido


- 1. *Intento de suicidio*.....04
- 1.1. *Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20*.....04
- 1.2. *Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 20*.....04
- 1.3. *Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia*.....05
- 1.4. *Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020*..... 06
- 1.5. *Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio*..... 06
- 1.6. *Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020*..... 08
- 1.7. *Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020*..... 08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 20.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 20 se notificaron a Sivigila 124 casos, para el año 2019 se notificaron 136 casos y para el año 2020 se han notificado 117 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 6 y la tendencia durante este año es a la disminución del número de los casos. Se observó una disminución del 14,0% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 20, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2017 a 2020 hasta semana epidemiológica 20.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 20, los municipios de Mocoa y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Villagarzón, Orito y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los municipios de San Francisco, Puerto Asís, Leguízamo, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Santiago, Colón y San Miguel se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2017 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 20

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2017-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	21	21
PUERTO ASIS	23	21
VALLE DEL GUAMUEZ	13	12
VILLAGARZÓN	12	10
LEGUIZAMO	9	16
ORITO	15	21
SAN MIGUEL	8	4
SIBUNDOY	4	7
PUERTO GUZMAN	5	6
PUERTO CAICEDO	7	11
SANTIAGO	3	4
COLON	3	2
SAN FRANCISCO	2	2
PUTUMAYO	129	137

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20 de 2017 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 20, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 23,3% de los casos, seguido de Mocoa con 22,4 % de los casos, Valle del Guamuéz con 9,5% de los casos, Leguízamo con 8,6% de los casos, Orito con 7,8% de los casos, Sibundoy con 6,9% de los casos, San Miguel y Villagarzón con 5,2% de los casos cada uno, Puerto Caicedo con 3,4% de los casos, Santiago, Colón, San Francisco y Puerto Guzmán con 1,7% de los casos, cada uno.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 20, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	27	23.3
MOCOA	26	22.4
VALLE DEL GUAMUEZ	11	9.5


LEGUIZAMO	10	8.6
ORITO	9	7.8
SIBUNDOY	8	6.9
SAN MIGUEL	6	5.2
VILLAGARZON	6	5.2
PUERTO CAICEDO	4	3.4
SANTIAGO	2	1.7
COLON	2	1.7
SAN FRANCISCO	2	1.7
PUERTO GUZMAN	2	1.7
OTRO DEPTO	1	0.9
Total general	116	100.0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 20, la presentó **Sibundoy** con 51,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Mocoa** con 44,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 40,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 36,2% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Francisco** con 35,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Leguízamo** con 33,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de 32,0 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es Puerto Guzmán con 5,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de 20,3 casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20- 2020

1.5. Variables socio-demográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables socio-demográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 20, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	71	60.7
	MASCULINO	46	39.3
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	77	65.8
	CENTRO POBLADO	8	6.8
	RURAL DISPERSA	32	27.4

TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	95	81.2
	CONTRIBUTIVO	4	3.4
	NO ASEGURADO	9	7.7
	EXCEPCIÓN	8	6.8
	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0.9
PERTENENCIA ÉTNICA	OTROS	103	88.0
	INDÍGENA	12	10.3
	AFROCOLOMBIANO	2	1.7
	ROM GITANO	0	0.0
	RAIZAL	0	0.0
GRUPOS DE EDAD	PALENQUERO	0	0.0
	0-4	0	0.0
	5-9	0	0.0
	10-14	19	16.2
	15-19	39	33.3
	20-24	20	17.1
	25-29	15	12.8
	30-34	8	6.8
	35-39	3	2.6
	40-44	5	4.3
	45-49	3	2.6
	50-54	3	2.6
	55-59	1	0.9
	60-64	0	0.0
	65-69	1	0.9
	70-74	0	0.0
75-79	0	0.0	
80-84	0	0.0	
85-89	0	0.0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 117 casos notificados, el 35,0 (41 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 65,0% (76 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 19 casos (46,3%), seguido de dos veces con 12 casos (29,3%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020

Numero de Intentos	Total	%
1 vez	19	46.3
2 veces	12	29.3
3 veces	4	9.8


Más de 3 veces	3	7.3
Desconocido	3	7.3
Total con intento	41	100.0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 117 casos notificados, el 70,0% (84 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 24,2 % (29 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 2,5 % cada uno (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia y lanzamiento al vacío y el 0,8 % (1 caso) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento a vehículo, los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 84 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (42 casos), seguidos de medicamentos (33 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-20, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 20- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemiología SSD