

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 11,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 44 (29 de
diciembre de 2019 al 31 de octubre) año 2020**



Grafica

- Grafica 1.** Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44
- Grafica 2.** Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020
- Grafica 3.** Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020

Tabla

- Tabla 1.** Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 44
- Tabla 2.** Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020.
- Tabla 3.** Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020
- Tabla 4.** Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020



Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 44	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020.....	08

1. Intento de suicidio

1.1. **Tendencia del evento de intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 44.**

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 44 se notificaron a Sivigila 284 casos, para el año 2019 se notificaron 331 casos y para el año 2020 se han notificado 260 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con los años anteriores, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 27 y la tendencia durante este año es a mantener el número de los casos. Se observó una disminución del 21,5% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Grafica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 44, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44 de 2018 a 2020

1.2. **Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2020 hasta semana epidemiológica 44.**

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 44, los municipios de Puerto Asís y Sibundoy presentaron incremento del número de casos. Los municipios de Valle del Guamuez, Villagarzón, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y el departamento de Putumayo presentaron decremento de los casos. Los demás municipios se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 44

MUNICIPIOS	PROMEDIO HISTORICO 2016-2019	OBSERVADO 2020
MOCOA	52	49
PUERTO ASIS	52	63
VALLE DEL GUAMUEZ	31	22
VILLAGARZÓN	29	19
LEGUIZAMO	18	16
ORITO	31	22
SAN MIGUEL	17	14
SIBUNDOY	11	21
PUERTO GUZMAN	12	5
PUERTO CAICEDO	11	4
SANTIAGO	9	11
COLON	6	6
SAN FRANCISCO	4	3
PUTUMAYO	282	255

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44 de 2016 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por residencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 44, el primer lugar lo ocupa el municipio de Puerto Asís con 24,2% de los casos, seguido de Mocoa con 18,8 % de los casos, Valle del Guamuez y Orito con 8,5% de los casos cada uno, Sibundoy con 8,1% de los casos, Villagarzón con 7,3% de los casos, Leguízamo con 6,2% de los casos, San Miguel con 5,4% de los casos, Santiago con 4,2% de los casos, Colón con 2,3% de los casos, Puerto Guzmán con 1,9% de los casos, Puerto Caicedo con 1,5% de los casos y San Francisco con 1,2% de los casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 44, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
PUERTO ASIS	63	24,2
MOCOA	49	18,8
VALLE DEL GUAMUEZ	22	8,5
ORITO	22	8,5


SIBUNDOY	21	8,1
VILLAGARZON	19	7,3
LEGUIZAMO	16	6,2
SAN MIGUEL	14	5,4
SANTIAGO	11	4,2
COLON	6	2,3
PUERTO GUZMAN	5	1,9
PUERTO CAICEDO	4	1,5
SAN FRANCISCO	3	1,2
OTRO DEPTO	5	1,9
Total general	260	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 44, la presentó **Santiago** con 150,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Sibundoy** con 135,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 108,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 93,7% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Mocóa** con 83,1% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Villagarzón** con 78,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **San Miguel** con 72,0% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de **71,0** casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es **Puerto Guzmán** con 13,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de **44,2** casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44- 2020

1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo con el tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de no asegurado y régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, 10 a 14 años y el grupo de edad de 24 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 44, 2020

VARIABLE	CATEGORÍA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	150	57,7
	MASCULINO	110	42,3
ÁREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	161	61,9
	CENTRO POBLADO	17	6,5
	RURAL DISPERSA	82	31,5
TIPO DE RÉGIMEN	SUBSIDIADO	207	79,6
	CONTRIBUTIVO	15	5,8
	NO ASEGURADO	20	7,7
	EXCEPCIÓN	17	6,5

PERTENENCIA ÉTNICA	INDETERMINADO/PENDIENTE	1	0,4
	OTROS	224	86,2
	INDÍGENA	30	11,5
	AFROCOLOMBIANO	5	1,9
	ROM GITANO	1	0,4
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	2	0,8
	10-14	32	12,3
	15-19	84	32,3
	20-24	61	23,5
	25-29	29	11,2
	30-34	21	8,1
	35-39	5	1,9
	40-44	9	3,5
	45-49	7	2,7
	50-54	7	2,7
	55-59	1	0,4
	60-64	0	0,0
	65-69	2	0,8
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
85-89	0	0,0	

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 260 casos notificados, el 32,7 (85 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 67,3% (175 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 39 casos (45,9%), seguido de dos veces con 25 casos (29,4%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	39	45,9
2 veces	25	29,4
3 veces	6	7,1
Más de 3 veces	10	11,8
Desconocido	5	5,9
Total con intentos	85	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 260 casos notificados, el 72,3% (188 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 20,8 % (54 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma corto-punzante, el 3,5 % (9 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento o asfixia, el 1,9 % (5 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de lanzamiento al vacío, el 1,2 % (3 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de arma de fuego y el 0,4 % (1 caso) tuvo intento de suicidio a través de lanzamiento a vehículo; los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 188 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (108 casos), seguidos de medicamentos (65 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-44, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 44- 2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD