

**Boletín mensual de Intento de suicidio,
Periodo 2,
Semana epidemiológica 1 a semana epidemiológica 8 (29 de
diciembre de 2019 al 22 de febrero) año 2020**



Grafica

Grafica 1. Casos de *intento de suicidio*, año 2018,2019 y 2020, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020

Grafica 3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020

Tabla

Tabla 1. Comportamiento inusual de *intento de suicidio*, Putumayo, 2016 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 8

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020

Tabla 4. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020



Tabla de contenido


1. Intento de suicidio.....	04
1.1. Tendencia intento de suicidio, 2017, 2018 y 2019, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8.....	04
1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2016 a 2019 hasta semana epidemiológica 8.....	04
1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia.....	05
1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.....	06
1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio.....	06
1.6. Distribución de los tipos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020.....	08
1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020.....	08

1. Intento de suicidio

1.1. Tendencia del evento de la intento de suicidio, año 2018, 2019 y 2020 hasta semana epidemiológica 8.

Para el año 2018 hasta la semana epidemiológica 8 se notificaron a Sivigila 48 casos, para el año 2019 se notificaron 58 casos y para el año 2020 se han notificado 48 casos, lo que nos indica que se disminuyó la cantidad de casos que se han notificado en el año 2020 comparado con el año anterior, es importante resaltar que para el último año la mayor presencia de casos se dio en la semana epidemiológica 6 y la tendencia durante este año es a la disminución del número de los casos. Se observó una disminución del 17,2% de los casos en el año 2020 comparado con el año 2019. Se notifican en promedio cada semana 6 casos.

Gráfica 1. Casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 8, 2018, 2019 y 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8 de 2018 a 2020

1.2. Comportamiento inusual del evento de intento de suicidio, año 2017 a 2020 hasta semana epidemiológica 8.

Para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 8, el municipio de Mocoa presentó incremento del número de casos. El municipio de Villagarzón presentó decremento de los casos. Los municipios de San Francisco, Puerto Asís, Leguízamo, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Guzmán, Santiago, Colón, Sibundoy y San Miguel se mantuvieron estables.

Tabla 1. Comportamiento inusual de intento de suicidio, Putumayo, 2017 a 2020, semanas epidemiológicas 1- 8

MUNICIPIOS	PROMEDIO HOSTORICO 2017- 2019	OBSERVADO
MOCOA	8	11
PUERTO ASIS	10	9
VALLE DEL GUAMUEZ	7	6
VILLAGARZÓN	5	4
LEGUIZAMO	3	5
ORITO	4	7
SAN MIGUEL	2	1
SIBUNDOY	3	4
PUERTO GUZMAN	2	3
PUERTO CAICEDO	3	3
SANTIAGO	1	2
COLON	1	1
SAN FRANCISCO	2	2
PUTUMAYO	50	58

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8 de 2017 a 2020

DECREMENTO	
INCREMENTO	
ESTABLE	

1.3. Proporción de casos de intento de suicidio por procedencia

Según la proporción de casos de intento de suicidio para el año 2020 hasta semana epidemiológica 8, el primer lugar lo ocupan los municipios de Mocoa y Puerto Asís con 27,1% de los casos, seguidos de Valle del Guamuez y San Miguel con 8,3 % de los casos, Leguízamo con 6,3% de los casos, Santiago, Sibundoy, Orito, Colón y Puerto Caicedo con 4,2% de los casos cada uno, Colón y Villagarzón con 2,1% de los casos cada uno. Los demás municipios no presentaron casos.

Tabla 2. Proporción de casos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 8, 2020

Municipio de RESIDENCIA	Total	Proporción
MOCOA	13	27,1
PUERTO ASIS	13	27,1
VALLE DEL GUAMUEZ	4	8,3
SAN MIGUEL	4	8,3
LEGUIZAMO	3	6,3


ORITO	2	4,2
SIBUNDOY	2	4,2
SANTIAGO	2	4,2
PUERTO CAICEDO	2	4,2
COLON	1	2,1
VILLAGARZON	1	2,1
FLORENCIA	1	2,1
Total general	48	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8- 2020

1.4. Incidencia de casos de intento de suicidio, para el año 2020.

La incidencia más alta de intento de suicidio en el año 2020 hasta semana epidemiológica 8, la presentó **Santiago** con 27,4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguido de **Mocoa** con 22,1 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **San Miguel** con 20,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Puerto Asís** con 19,3% casos nuevos por cada 100.000 habitantes, **Colón** con 18,1% casos nuevos por cada 100.000 habitantes y **Sibundoy** con 12,9% casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los demás municipios presentan incidencias más bajas que la del departamento que es de 12,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. El municipio con menor incidencia es Villagarzón con 4,2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una incidencia de 8,1 casos nuevos por 100.000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia de intento de suicidio, según municipio de procedencia, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8- 2020

1.5. Variables sociodemográficas del evento de intento de suicidio

Los casos notificados de intento de suicidio corresponden en mayor porcentaje al sexo femenino. Según el área de residencia la mayoría vive en la cabecera municipal, seguida de la zona rural dispersa y en tercer lugar en el centro poblado. De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, seguido de régimen de excepción. Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia, seguidos de etnia indígena. Los grupos de edad se encuentran en su mayoría en el rango de 15 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 y 10 a 14 años y en tercer lugar el grupo de edad de 25 a 29 años, los demás grupos con menor proporción de casos.

Tabla 3. Variables sociodemográficas de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1- 8, 2020

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	%
SEXO	FEMENINO	24	50,0
	MASCULINO	24	50,0
AREA DE RESIDENCIA	CABECERA MUNICIPAL	34	70,8
	CENTRO POBLADO	3	6,3
	RURAL DISPERSA	11	22,9
TIPO DE REGIMEN	SUBSIDIADO	40	83,3
	CONTRIBUTIVO	1	2,1
	NO ASEGURADO	3	6,3
	EXCEPCION	4	8,3
	INDETERMINADO/PENDIENTE	0	0,0
PERTENENCIA ETNICA	OTROS	41	85,4
	INDIGENA	6	12,5
	AFROCOLOMBIANO	1	2,1
	ROM GITANO	0	0,0
	RAIZAL	0	0,0
	PALENQUERO	0	0,0
GRUPOS DE EDAD	0-4	0	0,0
	5-9	0	0,0
	10-14	7	14,6
	15-19	15	31,3
	20-24	7	14,6
	25-29	6	12,5
	30-34	5	10,4
	35-39	1	2,1
	40-44	3	6,3
	45-49	2	4,2
	50-54	2	4,2
	55-59	0	0,0
60-64	0	0,0	

	65-69	0	0,0
	70-74	0	0,0
	75-79	0	0,0
	80-84	0	0,0
	85-89	0	0,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8- 2020

1.6. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, año 2020

De los 48 casos notificados, el 29,2 (14 casos) de los casos si tuvieron intentos previos y el 70,8% (34 casos) no tuvieron intentos previos. Según la distribución del número de intentos previos, el primer lugar es una vez con 10 casos (71,4%).

Tabla4. Distribución del número de intentos previos de intento de suicidio, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020


Numero de Intentos	Total	%
1 vez	10	71,4
2 veces	4	28,6
3 veces	0	0,0
Más de 3 veces	0	0,0
Desconocido	0	0,0
Total general	14	100,0

Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8- 2020

1.7. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, año 2020

De los 48 casos notificados, el 70,8% (34 casos) de los casos tuvieron intentos de suicidio mediante el mecanismo de intoxicación, el 25,0 % (12 casos) tuvieron intentos de suicidio con arma cortopunzante y el 4,2 % (2 casos) tuvieron intentos de suicidio a través de ahorcamiento, los demás mecanismos no tuvieron casos. De los 34 casos de intentos de suicidio por intoxicación, la mayoría utilizó plaguicidas (23 casos), seguidos de medicamentos (9 casos).

Grafica3. Distribución del mecanismo de intento de suicidio utilizado, Putumayo, semanas epidemiológicas 1-8, 2020



Fuente: Sivigila a semana epidemiológica 8-2020

Elaboró: Alexandra Mora Carvajal
Epidemióloga de apoyo

Revisó y aprobó: Andrea Morillo Gómez
P. E. área de Epidemióloga SSD