



BOLETIN N° 11.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.

SEMANA 48

**Violencias- Conducta Suicida-
Consumo Alcohol/SPA**





“Poniendo el objetivo en las personas con problemas de salud mental como un grupo vulnerable” Michelle Funk



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 46, 2016 (3 de Enero a 3 de Noviembre)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2016	6
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION	6
1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA	7
1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO	9
1.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	9
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	11
2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	11
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016	14
3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	14
3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2016.	16
3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-48-2016	17
3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 48-2016	18
3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	18
3.6 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	19
3.7 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.	20
3.8 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 48 -2016	20
CONCLUSIONES	22





LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016. . 7	
Gráfico 2. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016. 9	9
Gráfico 3 Distribución de casos de conducta suicida según mecanicismo causal. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016. 10	10
Gráfico 4. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016 10	10
Gráfico 5. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2016..... 14	14
Gráfico 6. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016..... 16	16
Gráfico 7. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016..... 17	17
Gráfico 8. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016. 17	17
Gráfico 9. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 48 Departamento del Putumayo 2016 18	18
Gráfico 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016 19	19
Gráfico 11 Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016..... 19	19
Gráfico 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016..... 21	21





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.....	6
Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Octubre- 2016. Departamento del Putumayo 2016	11
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.....	15





LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.....	8
Tabla 2. Conducta suicida según sexo e intentos previos. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.....	8
Tabla 3. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Octubre. Departamento del Putumayo 2016.....	12
Tabla 4. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Octubre. Departamento del Putumayo 2016.....	13
Tabla 5. <i>Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016</i>	20





1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2016

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 46 DEL AÑO 2016) con registro de las 10 IPS del departamento las cuales son : E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, E.S.E HOSPITAL PIO XII, ESE HOSPITAL ORITO, E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, E.S.E HOSPITAL MARIA ANGELINES, ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 265 Casos con conducta suicida, y al analizar estos casos por Municipio de Notificación, se evidencia que Mocoa, es el municipio con mayor Reporte en casos relacionados con conducta suicida, el cual reporta 64 casos con el evento intento suicida, seguido de Puerto Asís con 52 casos, Colon 33 casos, valle del Guamuéz 32, orito 30 casos, puerto Leguizamo 17 casos, Villagarzón 13, San miguel La dorada 12 casos, Puerto Caicedo 7 casos, puerto Guzmán 4 casos. Y 2 casos en municipio desconocido del departamento. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:


Que en el municipio de Mocoa con 15 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Leguizamo con 11 casos por 10.000, Puerto Asís con 8.6 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 7.1 casos por 10.000 Habitantes, Valle del Guamuéz, y villagarzon con 6.1 casos por 10.000 habitantes, en el caso de Colon al ser un municipio con población menor





a 10.000 habitantes, la incidencia se realiza con base 1.000 habitantes, en el cual se presentan 5.9 casos por 1.000 habitantes, orito con 5.9 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo 4.8 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 4.1 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 2,1 casos por 10.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfico 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48 Año 2016.

1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA

Para corte semana 48, se sigue evidenciado un aumento paulatino de los casos de conducta suicida, evidenciándose el mismo histórico donde las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 158 (59.7%) casos en mujeres, y 107(39.7%) casos en hombres.

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad y 20-24 tanto para hombres como para mujeres manteniendo la tendencia en todas las semanas epidemiológicas de este año; al evaluar el rango de edad de las mujeres, se encontró: el rango de edad 15-16 años de edad con un 41% (n=65), seguido de 20 -24 años de edad con un 21% (n= 33), seguido de 10-14 años de edad con un 14% (n=22), y de 25-29 años con un 8%(n=13), los demás rangos se pueden evidenciar en la tabla número 1.en cuanto a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 20-24 años con 26% (n=28), de 15 a19 años con un 25% (27) seguido de 25-29 años con 18 % (n=19), los demás rangos de edad se pueden evidenciar en la tabla 1.





Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.

Rango edad	Mujer	%	Hombre	%	Total general
10-14	22	14	4	3,7	26
15-19	65	41	27	25,2	92
20-24	33	21	28	26,2	61
25-29	13	8	19	17,8	32
30-34	7	4	9	8,4	16
35-39	6	4	4	3,7	10
40-44	6	4	9	8,4	15
45-49	5	3	2	1,9	7
50-54	1	1	2	1,9	3
55-59		0	1	0,9	1
60-64		0	1	0,9	1
75-79		0	1	0,9	1
Total general	158	100	107	100,0	265

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

En cuanto a los intentos previos realizado como intentos suicidios en hombres y en mujeres, se encuentra lo siguiente: que el 25 % (n=67) realizaron al menos un intento previo y 75% (n=198) % era la primera vez que registraron que realizaron intento suicida; de los que realizaron intento previo se encontró lo siguiente:

Realizaron un (1) intento previo 47%, (n=31), con dos (2) intentos previos 27% (n=18), con tres (3) intentos previos 6% (n=4), con cuatro (4) intentos previos 21% (n=14), y un 1% se encontraron sin dato.

Al describir los intentos previos según sexo, se encuentra que 21 casos en mujeres realizaron al menos un intento, 10 casos en mujeres realizaron al menos 2 intentos previos, 14 casos en mujeres realizaron 4 intentos previos, y 2 mujeres que realizaron 3 intentos previos. Con respecto a los hombres se presentaron, 10 casos con al menos 1 intento previo, 8 casos en hombres con al menos 2 intentos previos, y 2 casos en hombres con al menos 3 intentos, 1 caso en Mujer con finalidad muerto. Tabla 2.

Tabla 2. Conducta suicida según sexo e intentos previos. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.

Intentos	Mujeres	Hombres	Total general
1	21	10	31
2	10	8	18
3	2	2	4
4	14		14






Total general	47	20	67
---------------	----	----	----

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

1.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 39 indígenas, de las cuales son 23 mujeres y 16 hombres, 1 Afrocolombiana, 4 Rom de los cuales 3 Hombres, 1 mujer, y otras etnias 221 de las cuales 133 Mujeres, y 88 hombres. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

1.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar la comparación entre el último boletín semana 46 y semana 48 se puede evidenciar que hubo un aumento progresivo de casos con intento suicida, mostrándose de manera evidente que la intoxicación, es el medio que más utilizan como método para causarse daño con finalidad suicida; presentándose un aumento de 3 casos desde la semana 46 a 48 para un total de 208 casos, representando el 78% ; en cuanto al método ahorcamiento aumentaron se mantuvo el número de casos de 46 a 48; donde se mantienen 3 casos a la fecha representando un 1.2% , arma corto punzante aumentaron se mantuvo en en relación entre la semana 46 y 48 para un total de 40 casos a la fecha representando un 15 %, lanzamiento a vehículo se mantuvo en 3, lanzamiento a vacío se mantuvo en 4, otros mecanismos se mantuvo en 6; como se muestra la siguiente gráfica N 3.






Gráfico 3 Distribución de casos de conducta suicida según mecanismo causal. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

De acuerdo al sexo en relación al mecanismo causal se encontró que en mujeres hubieron 123 casos con intoxicación como mecanismo causante de autolesiones fue la, seguido de arma cortopunzante con 25 casos, lanzamiento al vacío con 5 casos, en el caso de los hombres se encontró que 85 casos utilizaron la intoxicación como mecanismo causante de autolesión, seguido de arma cortopunzante con 16 casos; cuanto ahorcamiento, lanzamiento al vacío y a vehículo se encontró 2 casos para cada tipo de mecanismo como se muestra en la gráfica número 4.

Gráfico 4. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.





2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 111 casos, según RIPS (corte Octubre) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 75% (86 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 25% (27 casos). Mapa 2.

Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Octubre- 2016. Departamento del Putumayo 2016



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre Año 2016.

En cuanto al rango de edad, se encontraron con afectación rangos de edad desde 10 a 14 años de edad en adelante;

De 10-14 años con 10 casos (4 mujeres y 6 hombres) con una frecuencia de 9%, de 15 a 19 años de edad 30 casos (7 mujeres y 23 casos en hombres) para una frecuencia de 27%, de 20 a 24 años con 23 casos (9 mujeres y 19 hombres) con una frecuencia de 20 %, de 25 a 30 años de edad con 14casos (4 mujeres y 10 hombres) con una frecuencia de 12 %, de



30-34 años de edad con 10 casos (2 mujeres y 8 hombres) con una frecuencia de 9%, de 35 a 39 años con 2 casos (2 hombres) con una frecuencia de 1.8%, de 40-44 años de edad con 8 casos (3 mujeres y 5 hombres) con una frecuencia de 7.2%, de 45-49 años de edad con 6 casos (2 mujer y 4 hombres) con frecuencia 5.4%, de 50-54 años de edad con 2 casos (2 hombres) con una frecuencia de 1.8 %, de 55-59 años de edad con 3 casos (3 hombres) con una frecuencia de 2.7 %, 65 -69 años de edad con 1 casos (1 hombres), con una frecuencia de 1%, de 70-74 años de edad 1 caso (1 hombre) presentando una frecuencia de 1 %, de igual manera en el rango de edad de >80 años de edad , como lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Octubre. Departamento del Putumayo 2016

Rango de edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
10-14	4	14,8	6	7,1	10	9,0
15-19	7	25,9	23	27,4	30	27,0
20-24	4	14,8	19	22,6	23	20,7
25-29	4	14,8	10	11,9	14	12,6
30-34	2	7,4	8	9,5	10	9,0
35-39		0,0	2	2,4	2	1,8
40-44	3	11,1	5	6,0	8	7,2
45-49	2	7,4	4	4,8	6	5,4
50-54		0,0	2	2,4	2	1,8
55-59		0,0	3	3,6	3	2,7
65-69		0,0	1	1,2	1	0,9
70-74		0,0	1	1,2	1	0,9
>80	1	3,7		0,0	1	0,9
Total general	27	100,0	84	100	111	100

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre , Año 2016.

Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de alucinógenos, cannabinoides, cocaína, por disolventes volátiles, por uso de múltiples drogas, opiáceos, uso de otros estimulantes incluida la cafeína, sedantes, tabaco, alcohol, cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: estado de abstinencia, abstinencia con delirio, intoxicación aguda, otros trastornos mentales y de comportamiento, trastorno mental y de comportamiento no específico, síndrome de dependencia, uso nocivo, trastornos psicóticos, y otros ;

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **intoxicación aguda** fue el alcohol con 11.7% (4 mujeres y 9 hombres), en cuanto al **estado de abstinencia** se encontraron que el uso de otras sustancias psicoactivas, presentaron una frecuencia de 5.4 %, a lo que equivalieron a 6 casos en hombres ; al referirse al **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento estuvieron: cocaína con 14 % (1 mujeres- 14 hombres),seguido de cannabinoides con 9.9% (2 mujeres- 9 hombres).



Los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la tabla 4.

Tabla 4. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Octubre. Departamento del Putumayo 2016

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	7,4	1	1,19	3	2,7
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		0,0	1	1,19	1	0,9
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	1	3,7	1	1,19	2	1,8
ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		0,0	2	2,38	2	1,8
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA		0,0	1	1,19	1	0,9
ALUCINOGENOS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		0,0	1	1,19	1	0,9
CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA		0,0	1	1,19	1	0,9
CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		0,0	1	1,19	1	0,9
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	7,4	9	10,71	11	9,9
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO		0,0	2	2,38	2	1,8
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	3	11,1	4	4,76	7	6,3
COCAINA: INTOXICACION AGUDA		0,0	1	1,19	1	0,9
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	7,4	14	16,67	16	14,4
VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	3,7	1	1,19	2	1,8
DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO		0,0	1	1,19	1	0,9
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		0,0	6	7,14	6	5,4
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA		0,0	2	2,38	2	1,8
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		0,0	2	2,38	2	1,8
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	7,4	3	3,57	5	4,5
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	3,7		0,00	1	0,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO	1	3,7		0,00	1	0,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO		0,0	3	3,57	3	2,7
OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1	3,7	1	1,19	2	1,8
TRASTORNOSEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1	3,7		0,00	1	0,9
TABACO: INTOXICACION AGUDA		0,0	1	1,19	1	0,9
TABACO: SINDROME DE DEPENDENCIA		0,0	2	2,38	2	1,8
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	4	14,8	9	10,71	13	11,7
ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	3,7	2	2,38	3	2,7
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	3,7	3	3,57	4	3,6






ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	3,7	2	2,38	3	2,7
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO	1	3,7	1	1,19	2	1,8
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO	1	3,7		0,00	1	0,9
ALCOHOL: USO NOCIVO	1	3,7	6	7,14	7	6,3
Total general	27	100	84	100	111	100

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. corte Octubre. Año 2016.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentaron más casos con 73 casos de los cuales mujeres fueron 54 casos y hombres 19 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron 38 casos de los cuales fueron 30 mujeres y 8 hombres como lo muestra la gráfica 5.

Gráfico 5. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2016



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. corte Octubre, Año 2016.

3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016

3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA


Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 48 año 2016, se encuentran 623 casos; de los cuales 19 casos son de residencia de Nariño, Caquetá, Huila, Ecuador y Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Mocoa 120 casos, Puerto Asís 101 casos, Valle del Guamuéz 80 casos, Puerto Leguizamo 57 casos, Villagarzón 52 casos, Puerto Guzmán 49 casos, Sibundoy 42 , casos, Orito 25 casos, Puerto Caicedo 24 casos, Santiago 17 casos, San Miguel la Dorada





16 casos, Colon 12 san francisco 5 casos. Y 4 casos correspondientes a municipio Desconocido. Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48 Año 2016


Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Colon con 41 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Leguízamo con 37 casos por 10.000 habitantes, seguido de Mocoa con 28 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 25 casos por 10.000 habitantes; Puerto Guzmán con 21 casos por 10.000; Puerto Asís con 17 casos por 10.000 habitantes, puerto Caicedo 16 casos por 10.000 habitantes, Santiago 16 casos por 10.00 habitantes, Valle del Guamuéz 15 casos por 10.000 habitantes, ,en cuanto a Colon y San Francisco como son municipios que no superan los 10.000 habitantes, su tasa de incidencia se presenta por 1.000 habitantes la cual corresponde para San Francisco 7 caso por 1.000 y colon 2 casos por 1.000 habitantes; los demás municipios se encuentran registrados en la gráfica 6. Evidenciándose que los municipios de puerto Leguízamo, Mocoa, Sibundoy, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Asís la tasa de incidencia supera la regional que es de 17 casos por 10.000 habitantes.





Gráfico 6. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de notificación. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

3.2 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2016.


3.2.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 623 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 75% (n=468) fueron Mujeres y el 25% (n=155) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 1-4 años de edad con 54 casos, seguido de 5-9 años de edad con 33 casos, de 10-14 años de edad con 25 casos. Mujeres: los tres grupos etareos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 130 casos, 20- 24 años de edad 59 casos, 15-19 años de edad con 58 casos, y de 5-9 años de edad con 51 casos; los demás rangos se evidencian en la Grafica 7.



Gráfico 7. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016

3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-48-2016

En el año 2016, con corte semana 48, de los 623 casos notificados por Violencia de Genero correspondientes al departamento del Putumayo, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 22, y 34; en comparación al 2015 se presentaron picos más altos en las semanas epidemiológicas 5 y 11, al realizar la comparación entre el total de casos entre la semana 48 del año 2015 y 2016, se presentan 45 casos más que en el año inmediatamente anterior a corte semana 48 del año 2016. Ver gráfico 8.

Gráfico 8. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.






3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 48-2016

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 16% son indígenas (70 Mujeres - 31 Hombres), 82% otros (393 Mujeres-119 Hombres), afrodescendiente 2% (3 Mujeres y 4 Hombres) y Rom 1% (2 mujeres y 1 Hombre). Ver Gráfico 9.

Gráfico 9. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 48 Departamento del Putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

3.5 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación al tipo de Violencia se encontró que la violencia física tiene mayor reporte de casos, tanto en hombres como en mujeres con un 44% (n=263) de los cuales 198 casos presentado en mujeres y un 65 casos en hombres, seguido de abuso sexual con un 24% (n=143) de los cuales fueron 127 casos mujeres y 16 casos, seguido de negligencia y abandono con 20% (n=118) casos 47 casos en mujeres y 64 casos en hombres. Ver grafica 10.





Gráfico 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.

3.6 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que **otro tipo de parentesco** son los que más realizan algún tipo de violencia hacia la víctima con un 28% (n=171), seguido de la madre con 20% (n=122), compañero permanente 13% (n=79), esposo 10% (n=62), novio 7% (42), padre 5% (n=29, cabe anotar que para los hombres quien es el mayor causante del acto es la madre. Como se muestra en la gráfica 11.

Gráfico 11 Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.





3.7 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: otros mecanismos 58%, contundentes, corto contundentes con un 31%, cortante y corto punzante 4 %, ahorcamiento, estrangulación, sofocación con un 4%, caídas 1.9 %, quemadura por Fuego o llama, proyectil arma de fuego y quemadura con liquido hirviente 0.5%, para cada uno. Ver tabla 5.

Tabla 5. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016

mecanismo utilizado	Total	%
Caídas	12	1,93
Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación	24	3,85
Contundente/cortocundente	192	30,82
Cortante/corto punzante/punzante	25	4,01
Proyectil arma de fuego	3	0,48
Quemadura con liquido Hirviente	3	0,48
Quemadura por fuego o llama	3	0,48
Otros Mecanismos	361	57,95
Total general	623	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.


3.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 48 -2016

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 75% (n=465) en comparación con los demás lugares, seguido de otros 9% (n= 57), las vías públicas con un 9%, (n=56), establecimiento comercial 2% (n=10), espacio terrestres al aire libre y centros educativos 2% (n= 11) cada uno, y lugares de esparcimiento con expendio de alcohol con 1% (n=10),y Ver gráfico 12.





Gráfico 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 48. Departamento del Putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 48. Año 2016.





CONCLUSIONES

- ✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís; Mocoa y Colon son donde más registros se encuentran notificados para este evento, más sin embargo en cuanto a la incidencia, los municipios con mayor tasa de incidencia; donde con este indicador se muestra Número de nuevos casos de enfermedad ocurrido en un periodo de tiempo específico en una población en riesgo al inicio del intervalo. fueron Mocoa, con 15 por 10.000 habitantes, Puerto Leguizamo el cual fue 11 casos por 10.000 habitantes y Puerto Asís con 9 por 10.000 habitantes, , tasas de incidencia que se tuvieron en cuenta por 10.000 habitantes porque ningún municipio del departamento del Putumayo sobrepasa la población a 100.000 habitantes.
- ✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida y trastornos mentales en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, en relación a el evento de conducta suicida el rango de edad se relaciona con la media nacional e internacional, De los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones específicamente por aquellos medicamentos utilizados como insecticidas en los hombres y en mujeres medicamentos para el sistema nervioso central.
- ✚ al analizar los trastornos mentales asociados a uso de consumo de Sustancias Psicoactivas como fuente RIPS, se encontró que la sustancia que más casos causaron **intoxicación aguda** fue el alcohol, seguido de cocaína, en cuanto al **estado de abstinencia** se encontraron que los alucinógenos, cannabinoides, y múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas y al referirse al **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento estuvieron: múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.
- ✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Mocoa, Puerto Asís y Valle del Guamuéz es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen del situación que vive el departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 1 a 4 años.

