



BOLETIN N° 8.
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL
Corte semana 28
Violencias- Conducta Suicida-
Consumo Alcohol/SPA



“Poniendo el objetivo en las personas con problemas de salud mental como un grupo vulnerable” Michelle Funk



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 28,2016 (3 de Enero a 16 de julio)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2016	6
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION	6
1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA	7
1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO	9
1.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	9
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	11
2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	11
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016	14
3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	14
3.2 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO Y RANGO DE EDAD. PUTUMAYO 2016	16
3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-28-2016	17
3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA. SEMANA 28-2016	17
3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	18
3.6 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	18
3.7 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR	19
3.8 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 21 -2016	20
CONCLUSIONES	21



LISTA DE GRAFICAS

Gráfico 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016..	7
Gráfico 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica en mujeres. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.....	9
Gráfico 3 Distribución de casos de conducta suicida según mecanismo causal. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.....	10
Gráfico 4. Intoxicaciones con intencionalidad suicida según categoría de producto. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016	10
Gráfico 5. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del putumayo 2016.....	14
Gráfico 6. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	16
Gráfico 7. Violencia de género en el departamento del putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 28. Departamento del Putumayo 2016.....	16
Gráfico 8. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.....	17
Gráfico 9. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.....	17
Gráfico 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016	18
Gráfico 11 Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	19
Gráfico 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.	20





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	6
Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Primer trimestre 2016. Departamento del putumayo 2016	11
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	15





LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	8
Tabla 2. Conducta suicida según sexo e intentos previos. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.	8
Tabla 3. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Primer trimestre. Departamento del putumayo 2016.....	12
Tabla 4. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Primer trimestre. Departamento del putumayo 2016	13
Tabla 5. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016	19




1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2016

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE NOTIFICACION

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 28 DEL AÑO 2016) con registro de las 10 IPS del departamento las cuales son : E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS, E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA, E.S.E HOSPITAL PIO XII, ESE HOSPITAL ORITO, E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, E.S.E HOSPITAL MARIA ANGELINES, ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 129 Casos con conducta suicida, y al analizar estos casos por Municipio de Notificación, se evidencia que Puerto Asís, es el municipio con mayor Reporte en casos relacionados con conducta suicida, el cual reporta 30 casos con el evento intento suicida, seguido de Mocoa con 27 casos, Colon 20 casos, orito 16 casos, valle del Guamuéz 12, puerto Leguizamo 11 casos, Puerto Caicedo 5 casos, San miguel La dorada 5 casos, Villagarzón 2, sin dato 1. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.



Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Puerto Leguizamo con 7 casos por 10.000, Mocoa 6 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 5 casos por 10.000 habitantes, en el caso de Colon al ser un municipio con población menor a 10.000 habitantes, la incidencia se realiza con base 1.000 habitantes, en el cual se presentan 4 casos por 1.000 habitantes los demás municipios se encuentran relacionados en la gráfica 1.

Gráfico 1. Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

1.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA

Para corte semana 28, se evidenciaron más casos de intentos suicidas en las mujeres que en los hombres, con 78 casos en mujeres, y 51 casos en hombres.

Con respecto al grupo de edad, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad y 20-24 tanto para hombres como para mujeres; comportándose de la siguiente manera: Mujeres en el rango de edad 15-16 años de edad con un 34.1% (n=44), seguido de 20 -24 años de edad con un 22.5% (n= 29), seguido de 25-29 años con un 14% (n=18), de 10-14 años de edad y de 40-44 años de edad con un 7.8 % (n=10), de 35-40 años de edad con un 5.4% (n=7), 30-34 años de edad con un 3.9% (n= 5), 45 -49 años de edad



con un 2.3%; (n= 3)., 50-54 años de edad con un 1.6 % (n= 2) y 75-79 años de edad con un 0.8% (n= 1). Como se pueden evidenciar en la tabla 1.

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima.
Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.

RANGO EDAD	MUJERES	%	HOMBRES	%	Total general
10-14	9	11,5	1	2,0	10
15-19	31	39,7	13	25,5	44
20-24	17	21,8	12	23,5	29
25-29	8	10,3	10	19,6	18
30-34	2	2,6	3	5,9	5
35-39	4	5,1	3	5,9	7
40-44	4	5,1	6	11,8	10
45-49	2	2,6	1	2,0	3
50-54	1	1,3	1	2,0	2
75-79			1	2,0	1
Total general	78	100	51	100%	129

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo.
Corte semana 28. Año 2016.

En cuanto a los intentos previos realizado como intentos suicidios, se encuentran que han realizado un intento previo el 24% , y 2 intento previos 76%, evidenciándose más casos en mujeres que en hombres, con 78 casos en mujeres, de los cuales 23 casos en mujeres realizaron al menos un intento, y 55 casos en mujeres realizaron al menos 2 intentos previos, en cuanto a los hombres se presentaron 8 casos con al menos 1 un intento, y 71 casos con al menos 2 intentos para un total de 51casos en hombres con intentos suicidas. Tabla 2.

Tabla 2. Conducta suicida según sexo e intentos previos. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.

Intentos previos	Mujer	%	Hombre	%	Total general	%
1	23	29	8	16	31	24
2	55	71	43	84	98	76
Total general	78	100	51	100	129	100


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo.
Corte semana 28. Año 2016.



1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 21 indígenas, de las cuales, 13 mujeres y 8 hombres, 3 Afrocolombianos de los cuales 1 Mujer y 2 Hombres y otras etnias 64 Mujeres, y 41 hombres que pertenecen a otras etnias para un total de 105 casos. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica en mujeres. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

1.4 DISTRIBUCION DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

La conducta Suicida en la población Putumayense en lo transcurrido del año 2016 corte semana 28, se realizó en un porcentaje elevado por medio de intoxicación el cual correspondió a un 81% de los cuales 44casos fueron Hombres y 61 casos en Mujeres, el 11% arma corto punzante, donde se evidenció que 10 Mujeres y 4 Hombres, el 3.8% otros mecanismos 4 casos en mujeres y 1 caso en hombres, 2.3 % lanzamiento al vacío 2 casos en mujeres y 1 en hombres, 0.7% lanzamiento al vehículo con 1 caso en mujer y 0.7% ahorcamiento en 1 caso correspondiendo al 0.7%.Ver Gráfico 3.


Gráfico 3 Distribución de casos de conducta suicida según mecanismo causal. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

De los casos presentados por intoxicaciones notificadas con intencionalidad suicida, al analizarla por tipo de clasificación de sustancia, y sexo se pudo observar que en hombres el tipo de sustancia más utilizada fueron los insecticidas con 10 casos, seguido de herbicida con 9 casos, uso veterinario 5 casos, los demás datos se encuentran relacionados en la gráfica 3. En el caso de las mujeres el tipo de sustancia más utilizado con intencionalidad suicida fueron sustancias asociadas al sistema nervioso central con 18 casos, seguido de insecticida con 11 casos, en tercer lugar los herbicidas con 9 casos, cuarto lugar de uso veterinario, los demás tipos se encuentran relacionados en la gráfica 4.

Gráfico 4. Intoxicaciones con intencionalidad suicida según categoría de producto. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.




2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 104 casos, según RIPS para el primer Semestre de año 2016(corte Junio) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 75% (78 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 25% (26 casos). Mapa 2.

Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Primer trimestre 2016. Departamento del putumayo 2016



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Primer trimestre Año 2016.

En cuanto al rango de edad, se encontraron con afectación rangos de edad desde 5 a 10 años de edad en adelante; de 5 a 10 años de edad 1 caso de sexo Hombre, de 10 a 14 años de edad 8 casos (3 mujeres y 5 Hombres) para una frecuencia de 7,7%, de 15 a 19 años de edad 30 casos (9 mujeres y 21 hombres) con una frecuencia de 28%, de 20 a 24 años de edad con 16 casos (6 mujeres y 10 hombres) con una frecuencia de 15% , de 25 a 29 años de edad con 14 casos (3 casos en mujeres y 11 casos en hombres) para una frecuencia de 13,5%, de 30 a 34 años de edad con 19 casos (2 mujeres y 17 hombres) con una frecuencia de 18.3%, 35 a 39 años de edad con 5 casos (2 mujeres y 3 hombres) con



una frecuencia de 4,8%, 40-44 años de edad con 4 casos (1 mujer y 1 hombre) para una frecuencia de 3,8%, 45 a 49 , y de 55 a 59 años de edad con 3 casos dado en hombres con una frecuencia de 2,9 para cada rango de edad, y un caso en el rango de edad de 60 años y más para una frecuencia de un 1%, para un total de 104 casos en presencia de 25 mujeres y 78 hombres como lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Primer trimestre. Departamento del putumayo 2016

Rango edad	MUJERES	%	HOMBRES	%	Total general	%
5-10			1	1,3	1	1,0
10-14	3	11,5	5	6,4	8	7,7
15-19	9	34,6	21	26,9	30	28,8
20-24	6	23,1	10	12,8	16	15,4
25-29	3	11,5	11	14,1	14	13,5
30-34	2	7,7	17	21,8	19	18,3
35-39	2	7,7	3	3,8	5	4,8
40-44	1	3,8	3	3,8	4	3,8
45-49		0	3	3,8	3	2,9
55-59		0	3	3,8	3	2,9
60 y mas		0	1	1,3	1	1,0
Total general	26	100	78	100	104	100

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Primer trimestre Año 2016.

Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de alucinógenos, cannabinoides, cocaína, por disolventes volátiles, por uso de múltiples drogas y usos de otras sustancias psicoactivas, estimulantes, sedantes, tabaco, alcohol, los cuales ocasionaron afecciones de tipo: trastorno psicótico, síndrome de dependencia, intoxicación aguda, uso nocivo, abstinencia con delirio, no especificado, y otros; de los cuales, la sustancia psicoactiva causante de **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento fue el cannabinoides con un 10,6% (11 casos, con 2 mujeres y 9 hombres), seguido de la cocaína con un 9,6% (10 casos en hombres); en cuanto a la **intoxicación aguda** se encontró que el alcohol fue el causante de mayor prevalencia el cual presento un 8,7% (3 casos en mujeres y 6 casos en hombres) seguido de la cocaína con un 7,7% (1 caso en mujer, y 8 casos en hombres), los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la tabla 4.



Tabla 4. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Primer trimestre. Departamento del putumayo 2016

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	MUJER	%	HOMBRE	%	Total general	%
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	7,7	4	3,8	6	5,8
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA		0,0	2	1,9	2	1,9
ALUCINOGENOS: OTROS T.M		0,0	5	4,8	5	4,8
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA		0,0	2	1,9	2	1,9
ALUCINOGENOS: T.M , NO ESPECIFICADO		0,0	2	1,9	2	1,9
CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA		0,0	1	1,0	1	1,0
CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		0,0	1	1,0	1	1,0
CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	1	3,8	2	1,9	3	2,9
CANNABINOIDES: OTROS T.M	1	3,8	1	1,0	2	1,9
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	7,7	9	8,7	11	10,6
CANNABINOIDES: T.M		0,0	1	1,0	1	1,0
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO		0,0	1	1,0	1	1,0
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	3	11,5	2	1,9	5	4,8
COCAINA: INTOXICACION AGUDA	1	3,8	7	6,7	8	7,7
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA		0,0	10	9,6	10	9,6
DISOLVENTES VOLATILES: INTOXICACION AGUDA		0,0	1	1,0	1	1,0
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	7,7		0,0	2	1,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: INTOXICACION AGUDA	1	3,8	4	3,8	5	4,8
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: OTROS T.M	1	3,8	1	1,0	2	1,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	7,7	2	1,9	4	3,8
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: T.M NO ESPECIFICADO	1	3,8	1	1,0	2	1,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRA SPA: TRASTORNO PSICOTICO	1	3,8	1	1,0	2	1,9
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SPA: USO NOCIVO		0,0	1	1,0	1	1,0
OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	2	7,7	1	1,0	3	2,9
ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: T.M , NO ESPECIFICADO		0,0	1	1,0	1	1,0
SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1	3,8		0,0	1	1,0
TABACO: INTOXICACION AGUDA		0,0	1	1,0	1	1,0
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	3	11,5	6	5,8	9	8,7
ALCOHOL: OTROS T.M	1	3,8	1	1,0	2	1,9
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	3,8	3	2,9	4	3,8
ALCOHOL: T.M , NO ESPECIFICADO		0,0	1	1,0	1	1,0
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO		0,0	1	1,0	1	1,0




ALCOHOL: USO NOCIVO		0,0	2	1,9	2	1,9
Total general	26	100	78	100	104	100,0

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Primer trimestre Año 2016.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentaron más casos con 68 casos de los cuales mujeres fueron 14 casos y hombres 54 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron 36 casos de los cuales fueron 12 mujeres y 24 hombres como lo muestra la gráfica 5

Gráfico 5. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del putumayo 2016



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Primer trimestre Año 2016.

3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2016


3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 28 año 2016, se encuentran 366 casos; de los cuales 10 son de residencia de Nariño, Caquetá y Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Colon 8 casos , Mocoa 79 casos, Orito 12 casos, Puerto Asís, 43 casos , Puerto Caicedo 13 casos , Puerto Guzmán 47 casos , Puerto Leguizamo 41 casos , San francisco 2 casos , San Miguel (la Dorada) 9 casos , Santiago 10 casos, Sibundoy 14 casos , Valle del Guamuéz 46 casos , Villagarzón 31 casos , Ver Mapa 3.





Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Puerto Leguizamo con 27 casos por 10.000 habitantes, seguido de Mocoa con 20 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 15 caso por 10.000; Villagarzón con 12 casos por 10.000; en cuanto a Colon como es un municipio que no supera los 10.000 habitantes, su tasa de incidencia se presenta por 1.000 habitantes la cual es 5 casos por 1.000 habitantes; los demás municipios se encuentran registrados en la gráfica 6.



Gráfico 6. Distribución de tasas de incidencia casos Violencia según municipio de notificación. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

3.2 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO Y RANGO DE EDAD. PUTUMAYO 2016

De los 366 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 73% (n=267) fueron Mujeres y el 27% (n=99) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etareos con mayor número de casos se encuentran de 1-4 años de edad con 37 casos, seguido de 5-9 años de edad con 26 casos, de 10-14 años de edad con 14 casos. Mujeres: los tres grupos etareos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 78 casos, 15-19 años de edad con 37 casos, y de 1-4 años de edad con 27 casos; los demás rangos se evidencian en la Grafica 7.

Gráfico 7. Violencia de género en el departamento del putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 28. Departamento del Putumayo 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016



3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA. SEMANA-28-2016

En el año 2016, con corte semana 28, de los 366 casos notificados por Violencia de Genero, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 13, 15 y 10; evidenciándose que a pesar que en el año 2015 se presentaron picos más altos en las semanas epidemiológicas en comparación con el año 2016, en el transcurso de este año se presentan 13 casos más que en el año inmediatamente anterior a corte primer trimestre del año 2016. Ver gráfico 8.

Gráfico 8. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA. SEMANA 28-2016

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 18% son indígenas (43 Mujeres - 23 Hombres), 80% otros (222 Mujeres-73Hombres) gitano 0.5% (2 mujeres), y Afrodescendiente 0.8% (3 Hombres). Ver Gráfico 9.

Gráfico 9. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

3.5 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación al tipo de Violencia se encontró que la violencia física tiene mayor reporte de casos, tanto en hombres como en mujeres, con un 43% (n=158) de los cuales 122 (77 %) casos presentado en mujeres y un 36 casos (23%) en hombres, seguido de abuso sexual con un 24% (n=89) de los cuales fueron 78 casos (87%) mujeres y 11 casos (77 %), seguido de negligencia y abandono con 20% (n=74) casos 29 (39%) casos en mujeres y 45 (60%) casos en hombres. Ver grafica 10.

Gráfico 10. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

3.6 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que otro tipo de parentesco son los que más realizan algún tipo de violencia hacia la víctima con un 26% (n=94), seguido de la madre con 20.5% (n=75), compañero permanente 13.4% (n=49), esposo 10% (n=37), padre 6% (n=22), en menor número se encontraron los demás parentescos como lo muestra la gráfica 11.

Gráfico 11 Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.

3.7 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: otros mecanismos 58.5%, contundentes, corto contundentes con un 32.8%, ahorcamiento, estrangulación, sofocación con un 3.6%, caídas 2.5 %, cortante y corto punzante 2.2 %, quemadura por Fuego o llama 0.5% y quemadura con liquido hirviente 0.3% Ver tabla 5.

Tabla 5. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 28. Departamento del putumayo 2016

MECANISMO UTILIZADO	CASOS	%
Caídas	9	2,5
Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación	13	3,6
Contundente/cortocundente	119	32,5
Cortante/corto punzante/punzante	8	2,2
otros mecanismos	214	58.5
Quemadura con liquido Hirviente	1	0,3
Quemadura por fuego o llama	2	0,5
Total general	366	100


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.



3.8 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO. CORTE SEMANA 21 -2016

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 75% (n=273) en comparación con los demás lugares, seguido de otros 10% (n= 38), las vías públicas con un 7%, (n=26), espacio terrestres al aire libre 2% (n= 6), establecimiento comercial 2% (n= 6) y centros educativos con un 2 % (n= 6) Ver gráfico 12

Gráfico 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 21. Departamento del putumayo 2016.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 28. Año 2016.



CONCLUSIONES

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís ; Mocoa y Colon son donde más registros se encuentran notificados para este evento, más sin embargo en cuanto a la incidencia, los municipios con mayor tasa de incidencia fueron Puerto Leguizamo el cual fue 7 casos por 10.000 habitantes, seguido de Mocoa con 6 casos por 10.000 habitantes, tasas de incidencia que se tuvieron en cuenta por 10.000 habitantes porque ningún municipio del departamento del Putumayo sobrepasa la población a 100.000 habitantes.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, relacionándose con la media nacional e internacional, De los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones específicamente por aquellos medicamentos utilizados como insecticidas en los hombres y en mujeres medicamentos para el sistema nervioso central.

✚ Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de alucinógenos, cannabinoides, cocaína, por disolventes volátiles, por uso de múltiples drogas y usos de otras sustancias psicoactivas, estimulantes, sedantes, tabaco, alcohol, los cuales ocasionaron afecciones de tipo: trastorno psicótico, síndrome de dependencia, intoxicación aguda, uso nocivo, abstinencia con delirio, no especificado, y otros; de los cuales, la sustancia psicoactiva causante de **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento fue el cannabinoides seguido de la cocaína; en cuanto a la **intoxicación aguda** se encontró que el alcohol fue el causante de mayor prevalencia) seguido de la cocaína.

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Asís es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos Si bien hay subregistro y los datos no proporcionan una imagen precisa de los fenómenos, las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 1 a 4 años.

