



BOLETIN N° 17

SEMANA 47

**CONDUCTA SUICIDA, TRASTORNOS MENTALES,
CONSUMO DE SPA/ALCOHOL, VIOLENCIAS.**





Sin Salud, No hay Salud mental



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 47, 2017 (1 de Enero a 25 Noviembre)



Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017	5
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	5
1.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO ...	6
1.2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.....	6
1.2.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO POBLACIONAL.....	8
1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO.....	8
1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO	9
1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA	10
1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	11
1.7 CORRESPONDENCIA CASOS DE INTENTO SUICIDA Y SEGUIMIENTO DE CASO SEGÚN IPS DEL DEPARTAMENTO.	11
2. TRASTORNO MENTAL.....	12
2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	18
2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	18
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017	22
3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	22
3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.	23
3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	23
3.2 COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INCIDENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.....	24
3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA.	25
3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA.	26
3.4 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO.....	26



3.5	RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA.....	27
3.6	VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	28
3.7	VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	28
	CONCLUSIONES	29

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1	Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.	6
Gráfica 2.	Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017	9
Gráfica 3.	Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.	10
Gráfica 4.	Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017	11
Gráfica 5.	Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017	21
Gráfica 6.	Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.	23
Gráfica 7.	Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	24
Gráfica 8.	Violencia de género en el departamento del Putumayo según Tasa de incidencia, Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.	25
Gráfica 9.	Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	25
Gráfica 10.	Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 47 Departamento del Putumayo 2017	26
Gráfica 11.	Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	27
Gráfica 12.	Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	27
Gráfica 13.	Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	28
Gráfica 14.	Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	29





LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	5
Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Noviembre 2017 Departamento del Putumayo 2017.....	19
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	22

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	7
Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	7
Tabla 3. Distribución de intentos de suicidio según sexo en grupos carcelarios. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	8
Tabla 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.....	10
Tabla 5. Trastornos mentales. Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017.	12
Tabla 6. Trastornos mentales según sexo. Corte Noviembre Departamento del Putumayo 2017.....	14
Tabla 7. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2017.	15
Tabla 8. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017.....	19
Tabla 9. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017. ...	20






1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2017

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 47 del año 2017) con registro de las siguientes IPSs del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 325 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de Notificación, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 58 casos, Mocoa 53 casos , Villagarzón 45 casos, Valle del Guamuéz 37 casos, Orito 30, san miguel (la dorada) 26 casos, Puerto Caicedo 16 casos, Puerto Leguizamo 13 casos , Puerto Guzmán 13 casos, Sibundoy 9 casos , Colon 5 casos, San francisco 3 casos, 3,*Putumayo Municipio desconocido 4 casos. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47 . Año 2017.






Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se han presentado 21.22 casos por 10.000 habitantes, seguido Puerto Guzmán con 15.42 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 11.89 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 10.90 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 9.43 casos por 10.000, San Miguel la Dorada con 9.38 casos por 10.000 habitantes, se encontraron por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 9.18 casos por 10.000 habitantes a la fecha, por debajo de la tasa de incidencia de Putumayo se encuentra, Puerto Leguizamo con 8.44 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 6.97 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy con 6.29 casos por 10.000 habitantes, Orito con 5.45 casos por 10.000 habitantes, Colon con 0.89 casos por 10.000 habitantes y San Francisco con 0.42 casos por 10.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfica 1 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

1.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

1.21 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 47, se sigue evidenciado un aumento paulatino de los casos de conducta suicida, evidenciándose el mismo histórico donde las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 197 (60%) casos en mujeres, y 128 (39.38%) casos en hombres.



Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 años de edad, tanto para hombres como para mujeres; al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: de 10-14 años con 20 % (n=39), de 15-19 años de edad con un 42% (n=83), de 20-24 años de edad con un 17% (n= 34), los demás rangos se pueden evidenciar en la tabla número 1.

En cuanto a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 15-19 años con 33% (n=42), de 20-24 años con un 26% (n=33), seguido de 25-29 años con 14% (n=18), los demás rangos de edad se pueden evidenciar en la tabla 1.

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.

Rango de edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general
10-14	39	19,80	7	5,47	46
15-19	83	42,13	42	32,81	125
20-24	34	17,26	33	25,78	67
25-29	14	7,11	18	14,06	32
30-34	13	6,60	8	6,25	21
35-39	8	4,06	6	4,69	14
40-44	2	1,02	6	4,69	8
45-49	2	1,02	3	2,34	5
50-54	2	1,02	3	2,34	5
55-60	0	0,00	2	1,56	2
Total general	197	100,00	128	100,00	325

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

De los 325 casos reportados el 72 % (n= 237) no tuvieron intentos previos, el 27 % (n= 88) tuvieron intentos previos, de los que presentaron historial de intentos suicidas, el 45% (n=40), tuvieron 1 intento previo, (mujeres n=24 y hombres n= 16), 2 intento previo con 22% (n= 16 hombres y n=4 hombres), 3 intentos previos 11% n=10(n= 5 mujeres y n=6 hombres), 4 intentos suicidas 12% (n=5 mujeres, n=6 hombres).como lo muestra la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.

Historial Intentos suicidas	Mujeres	Hombres	Total general
<i>sin intento</i>	140	97	237
<i>Con intentos previos</i>	57	31	88
<i>Al menos 1intento</i>	24	16	40
<i>Al menos 2 intentos</i>	16	4	20
<i>Al menos 3 intentos</i>	7	3	10
<i>Al menos 4 intentos</i>	5	6	11
<i>sin dato/ no recuerda</i>	5	2	7

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.





1.2.2 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO POBLACIONAL

Durante, el periodo analizado, por grupos poblacionales de interés, Para corte semana 47 del presente año, se encontró que de los intentos suicidios presentados el 1.85 % perteneció a población desplazada, seguido de gestantes, y grupo ICBF con un 0.92% para cada grupo, población víctima de violencia con 0.62%, en lo que compete a población con discapacidad, migrantes, desmovilizados y población carcelaria alcanzo un 0.31 % para cada grupo. Ver tabla 3.

Tabla 3. Distribución de intentos de suicidio según sexo en grupos carcelarios. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.

Grupo Poblacional	Mujeres	Hombres	%
grupo discapacidad	1	1	0,31
grupo desplazados	1	15	1,85
grupo migrantes	1	0	0,31
grupo carcelario		1	0,31
gestantes	3	0	0,92
grupo ICBF	3	0	0,92
grupo desmovilizado	0	1	0,31
Grupo victima violencia	2	0	0,62

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.


1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 33 indígenas, de las cuales son 14 mujeres y 19 hombres, 7 Afrocolombianos, 4 mujer y 3 hombres, otro 283 casos de los cuales 178 mujeres y 105 hombres. Ver Gráfico 2.





Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.


1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 50,77% (mujeres n=88, hombres n=77), seguido de problemas económicos 10.46%(mujeres n=20, hombres n=77), maltrato físico 10.15%, (mujeres n=30, hombres n=3), muerte familiar 5.23%, enfermedad grave 3.38 % (mujeres n=5, hombres n=6), Escolar 2.46%, (mujeres n=6, hombres n=2), suicidio familiar 2.46% (mujeres n=7, hombres n=1), problemas laborales 1.54% (mujeres n=3 , hombres n=2),problemas legales 1.23% (mujeres n=2, hombres n=2).Ver grafica 3.



Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 325 casos 68 (20%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental; de las persona con trastorno psiquiátrico asociados el más común es el trastorno depresivo, seguido de esquizofrenia, trastorno de personalidad, trastorno bipolar, y abuso de sustancias psicoactivas. Ver tabla 4.

Tabla 4. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.

trastorno psiquiátrico	total	porcentaje sobre grupo	Porcentaje total
Trastorno depresivo	57	83,8	17,54
Esquizofrenia	4	5,9	1,23
Trastorno de la personalidad	3	4,4	0,92
trastorno bipolar	3	4,4	0,92
abuso sustancias	1	1,5	0,31

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.





1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 47 de 2017 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 75.4 % (mujeres n=150,hombres n=95), arma corto punzante 14.8%(mujeres n=31,hombres n=17), ahorcamiento con 4.0% (hombres n=8, mujeres n=5), lanzamiento al vacío 3.4% (mujeres n=7, hombres N=4), en relación a mujeres y hombres se evidenció que las mujeres (60.61%) presentan más prevalencia con conducta suicida que los hombres (39.38%), con una diferencia de 21.23 puntos porcentuales por encima de los casos de los hombres. Ver grafica 4

Gráfica 4.Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

1.7 CORRESPONDENCIA CASOS DE INTENTO SUICIDA Y SEGUIMIENTO DE CASO SEGÚN IPS DEL DEPARTAMENTO.

Al analizar el evento intento de suicidio con los seguimientos realizados por IPSs /EAPB a estos casos con corte mes de Octubre se encontró que no hay una correspondencia al 100%, sin embargo se evidencia que por parte de las instituciones va aumentando la corresponsabilidad de los eventos de salud mental y apropiación de la temática; estos seguimientos se recepcionan de manera mensual a inicio de mes.





MUNICIPIO	SIVIGILA	PROGRAMA
HOSPITAL PIO XII-COLON	19	6
HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ- MOCOYA	55	51
HOSPITAL ORITO	30	21
HOSPITAL LOCAL PUERTO ASIS	56	17
HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ- PUERTO CAICEDO	16	8
HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN – PUERTO GUZMAN	12	7
HOSPITAL MARIA ANGELINES – PUERTO LEGUIZAMO	10	5
HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL- VILLAGARZON	44	15
HOSPITAL FRONTERIZO- SAN MIGUEL	25	22
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS- VALLE DEL GUAMUEZ	40	36

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Octubre . Año 2017.

2. TRASTORNO MENTAL

En lo transcurrido del año según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental con corte Noviembre, con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 1342 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia , trastorno por uso de alcohol , trastorno por uso de drogas, epilepsia y autolesión; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales . Tabla N° 5

Tabla 5. Trastornos mentales. Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017.

TRASTORNO MENTAL	TOTAL
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	277
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	225
TRASTORNO DEPRESIVO	150
TRASTORNO DEL DESARROLLO	131
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO	124
ESQUIZOFRENIA	80
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	41
TRASTORNOS PSICOTICOS	36
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	31
TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	28
TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	26
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	23





TRASTORNOS DE ADAPTACION	19
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	14
TRASTORNO DISOCIATIVO [DE CONVERSION], NO ESPECIFICADO	13
OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	9
TRASTORNO DELIRANTE	9
TRASTORNO MENTAL ORGANICO O SINTOMATICO, NO ESPECIFICADO	7
TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA	6
TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES, NO ESPECIFICADO	6
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	6
TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], ORGANICOS	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	5
AUTISMO	4
OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	4
TRASTORNO EMOCIONAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	3
TRASTORNO HIPERCINETICO DE LA CONDUCTA	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO	3
TRASTORNOS MIXTOS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD	3
DEPRESION POSTESQUIZOFRENICA	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: USO NOCIVO	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	2





TRASTORNOS DISOCIATIVOS MIXTOS [Y DE CONVERSION]	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE TABACO: SINDROME DE DEPENDENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO GRAVES, ASOCIADOS CON EL PUERPERIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1
Total general	1342

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Noviembre -Año 2017.

De los trastornos mentales nombrados en la tabla N° 6, los de mayor incidencia fueron trastorno de ansiedad con 277 casos correspondiente al 20.64%, trastorno mixto de ansiedad y depresión con 225 casos correspondiente al 16.77 %, trastorno depresivo con 150 casos correspondiente al 11.18%, los demás trastornos se relacionan en la tabla 5.

En cuanto al rango de edad, los tres rangos de edad que presentaron mayor prevalencia fueron: 5-9 años con 190 casos, seguido de 15-19 años con 150 casos, 10-14 años con 147 casos, los demás rangos de edad están relacionados en tabla 6

Tabla 6. Trastornos mentales según sexo. Corte Noviembre Departamento del Putumayo 2017.

rango de edad	F	M	Total general
0-4	43	83	126
5-9	73	117	190
10-14	65	82	147
15-19	61	89	150
20-24	44	51	95





25-29	46	44	90
30-34	56	26	82
35-39	49	28	77
40-44	59	18	77
45-49	61	16	77
50-54	49	12	61
55-59	39	19	58
60-64	33	8	41
65-69	18	5	23
70-74	13	7	20
75-79	7	3	10
80-84	7	1	8
85-89	7	2	9
90-94	1	0	1
Total general	731	611	1342

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Noviembre -Año 2017.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 7. Trastornos mentales de los tres rangos de edad con mayor prevalencia. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2017.

rango de edad	TRASTORNO MENTAL	Total
5-9	AUTISMO EN LA NIÑEZ	2
	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	2
	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	1
	EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	2
	OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	2
	OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	5
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	18
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	36
	TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACION EN LA NIÑEZ	2
	TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	13
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO	26
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	32
	TRASTORNO DEL DESARROLLO PSICOLOGICO, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	12
	TRASTORNO EMOCIONAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	3
	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA LECTURA	1
	TRASTORNO HIPERCINETICO DE LA CONDUCTA	1



	TRASTORNO MENTAL ORGANICO O SINTOMATICO, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	4
	TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES, NO ESPECIFICADO	3
	TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	10
	TRASTORNOS DE ADAPTACION	2
	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	7
	TRASTORNOS MIXTOS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD	1
Total 5-9		190
10-14	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	8
	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	5
	EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	6
	ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	1
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	3
	OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	2
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	11
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	12
	TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	8
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	1
	TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	2
	TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	1
	TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	19
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO	10
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	10
	TRASTORNO DEL DESARROLLO PSICOLOGICO, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	1
	TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA	1
	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1
	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	1
	TRASTORNO DISOCIATIVO [DE CONVERSION], NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1
	TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO HIPERCINETICO DE LA CONDUCTA	1
	TRASTORNO MENTAL ORGANICO O SINTOMATICO, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	13
	TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES, NO ESPECIFICADO	2
	TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	11
	TRASTORNOS DE ADAPTACION	1
	TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], ORGANICOS	1
	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	4
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	1
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	1
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	3





	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1
Total 10-14		147
15-19	AUTISMO ATIPICO	1
	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	4
	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	5
	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	7
	EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	11
	ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	1
	OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES	2
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	4
	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	3
	OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	1
	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	3
	OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	4
	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	1
	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1
	TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	18
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	5
	TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	3
	TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ, NO ESPECIFICADO	2
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO	4
	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	2
	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	1
	TRASTORNO DELIRANTE	1
	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	2
	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	1
	TRASTORNO DISOCIATIVO [DE CONVERSION], NO ESPECIFICADO	3
	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	1
	TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO MENTAL ORGANICO O SINTOMATICO, NO ESPECIFICADO	1
	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	19
	TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	2
	TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, CON SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA	2
	TRASTORNOS DE ADAPTACION	6
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	8
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	2
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	1
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	2
	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA	3





TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: USO NOCIVO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO	1
Total	150
15-19	
Total general	487

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Noviembre -Año 2017.

- ✓ **5- 9 años:** se encontraron 190 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron trastorno del desarrollo y de comportamiento.
- ✓ **10-14 años:** se encontraron 147 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia, trastorno del desarrollo y de comportamiento.
- ✓ **15-19 años:** se encontraron 150 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia, trastorno del de mixto de ansiedad y depresión, y de ansiedad, seguido de episodios depresivos
- ✓

Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 7.

2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS


2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 145 casos, según RIPS (corte septiembre) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 77% (113 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 22% (32 casos). Mapa 2.





Mapa 2. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Noviembre 2017 Departamento del Putumayo 2017



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Noviembre Año 2017.

En cuanto al rango de edad, se encontró que de 15-19 años con 33%, 20-24 años de edad con 23.4 %, de 25-29 años con 16 % los demás rangos de edad se encuentran la tabla 8.

Tabla 8. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017

Rango edad	Mujeres	Hombres	Total general	Porcentaje
0-4	1		1	0,7
10-14	4	4	8	5,5
15-19	12	36	48	33,1
20-24	7	27	34	23,4
25-29	5	19	24	16,6
30-34		7	7	4,8
35-39	1	9	10	6,9
40-44		1	1	0,7
45-49	2	4	6	4,1
50-54		3	3	2,1
55-59		3	3	2,1
Total general	32	113	145	100,0

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Noviembre , Año 2017.





Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **intoxicación aguda** fue Cocaína con 9 % (6 Mujeres -7 Hombres); al referirse al **síndrome de dependencia** como trastorno mental y de comportamiento estuvieron: canabbinoides con 16 % (4 mujeres- 19 hombres) y cocaína con 8% (3 mujeres-8 hombres), **uso nocivo** alcohol con un 8% (4 mujer y 8 hombres).

Los demás trastornos mentales causados por uso de sustancias psicoactivas se encuentra en la tabla 9.

Tabla 9. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Noviembre. Departamento del Putumayo 2017.

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	Hombres	Total
NICOTINA		1	1
DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA		4	4
T ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	2	3
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1		1
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
ALUCINOGENOS: USO NOCIVO	1		1
CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1
CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA		1	1
CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	19	23
CANNABINOIDES: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		2	2
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO		6	6
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	1	10	11
COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1
COCAINA: INTOXICACION AGUDA	6	7	13
COCAINA: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	3	8	11
COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
COCAINA: USO NOCIVO		2	2
DISOLVENTES VOLATILES: INTOXICACION AGUDA		1	1
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		4	4
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	3	1	4
MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	4	6






MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		4	4
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1	8	9
OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	1	1	2
OPIACEOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO		1	1
OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO	1		1
SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1		1
TABACO: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1
ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA		2	2
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA		2	2
ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA		5	5
ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1		1
ALCOHOL: USO NOCIVO	4	8	12
Total general	32	113	145

fuelle: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Noviembre . Año 2017.

En el caso de la zona rural o urbana, se encontró que la zona rural presentaron más casos con 84 casos de los cuales mujeres fueron 15 casos y hombres 69 casos, en cuanto a la zona urbana se encontraron 47 casos de los cuales fueron 11 mujeres y 36 hombres como lo muestra la gráfica 5.

Gráfica 5. Trastornos mentales según zona rural y sexo. Departamento del Putumayo 2017



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo Noviembre , Año 2017.






3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2017

3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 47 año 2017, se encuentran 728 casos; de los cuales 28 casos son de residencia del Huila, Tolima, Nariño, Amazonas, Caldas, Cauca, Valle del Cauca, los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Puerto Asís 151 casos, Mocoa 134 casos, Valle del Guamuéz 93 casos, Villagarzón 52 casos Puerto Leguizamo 48 casos, , Sibundoy 44 casos, Orito 40 casos, Puerto Guzmán 36 casos, Puerto Caicedo 30 casos San Miguel 22 casos, Santiago 19 casos, San Francisco 12 casos, Colon 13 casos y 6 casos correspondientes a Putumayo Municipio Desconocido. Ver Mapa 1.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017


Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:





Que en el municipio de Puerto Leguizamo se presentaron 31,18 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy con 30.75 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 30.64 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 24.56 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 24.4 casos por 10.000 habitantes, se encuentran por encima de la tasa de incidencia de Putumayo, la cual es de 20.56 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 20.44 casos por 10.000 habitantes, Santiago 17.82 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 17.53 casos por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 15 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 7.94 casos por 10.000 habitantes, Orito 7.27 casos por 10.000 habitantes, Colon con 2.32 casos por 10.000 habitantes, San Francisco con 1.68 casos por 10.000 habitantes. Ver gráfica 6.

Gráfica 6. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.

3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 728 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 83.65% (n=609) fueron Mujeres y el 16.34% (n=119) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto






en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 35 casos, de 5-9 años con 33 casos y de 10-14 años con 20 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 149 casos, 15-19 años de edad con 92 casos, y de 5-9 años de edad con 67 casos para cada uno; los demás rangos se evidencian en la Grafica 7.

Gráfica 7. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INCIDENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Al revisar la tasa de incidencia desde el año 2015 en el departamento del Putumayo, presenta un comportamiento con tendencia al aumento; en el año 2015 se presentaron 166 casos por 100.000 habitantes, 2016, 175 por 100.000 habitantes, y en 2017, 205 casos por 100.000 habitantes con corte semana 47, evidenciándose en todos los años mayor presencia de casos en mujeres que en los hombres como se muestra en la gráfica 8





Gráfica 8. Violencia de género en el departamento del Putumayo según Tasa de incidencia, Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017

3.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLOGICA.

En el año 2017, con corte semana 47, de los 728 casos notificados por Violencia de Género correspondientes al Departamento del Putumayo, se Puede evidenciar picos más altos en las semanas 1, 13 y 18; en comparación al 2016 se presentaron picos más altos en las semanas epidemiológicas 18, 28, 34, al realizar la comparación entre el total de casos entre la semana 47 del año 2016 y 2017, se presentan 117 casos menos en el año inmediatamente anterior a corte semana 47 que el año 2017. Ver gráfico 9.

Gráfica 9. Comportamiento epidemiológico de tipos de violencia según semana epidemiológica. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.






3.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA.

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 11.68% son indígenas (71Mujeres – 14 Hombres), 1.51 % son Afrocolombianos (10 Mujeres – Hombre 11), 0,27% son ROM (1 Mujer – 1 Hombre) y 86.54 % otros (527 Mujeres - 103 Hombres). Ver Gráfico 10.

Gráfica 10. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 47 Departamento del Putumayo 2017



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.


3.4 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 251 casos, seguido de abuso sexual con 207 casos, negligencia y abandono con 107 casos, violación con 52 casos, otras formas de violencia como acoso sexual, violencia psicológica, violencia sexual en conflicto armado se encontraron en menos proporción como lo muestra la gráfica 11; en cuanto a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 55 casos, seguido de violencia física con 34 casos, abuso sexual con 25 casos, otros tipos de violencia que se presentaron para los hombres fueron violación con 3 casos y violencia psicológica con 1 caso. Ver grafica 11.





Gráfica 11. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

3.5 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que “Ninguno” es la que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 29.81 % (n=217), seguido por pareja con 22.25 % (n=162), madre con 14.84% (n=108), familiar con 13.87% (n=101), Expareja con 8.10 % (n=46), padre con 4,8 % (n=47), seguido por otros tipos de parentesco tal como se muestra en la gráfica 12.

Gráfica 12. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.






3.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: Sin información 60,99%, contundente/corto contundente con un 27%, otros mecanismos con 5,22%, ahorcamiento/sofocación/estrangulamiento con 2,8%, cortante/cortó punzante/punzante con 2,47%, proyectil arma de fuego 0,7%, caídas con 0,5%, quemadura por fuego o llama 0,2%, quemadura con liquido hirviendo 0,14%. Como se muestra en la gráfica 13.

Gráfica 13. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.


3.7 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

En cuanto al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 73,2% (n=444) en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 10,5% (n=77), Otros con 7,4%(n=54), espacios terrestres al aire libre 4% (n=29), lugares de esparcimiento con expendido de alcohol 2 % (n=14), centros educativos con 1,7% (n=13) y establecimiento comercial con 1 % (n=8). Ver gráfico 14.





Gráfica 14. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 47. Departamento del Putumayo 2017.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 47. Año 2017.

CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental en los cuales se incluyen, conducta suicida, trastornos mentales, consumo de SPA y violencias de género, indican que en el Departamento del Putumayo, se ha ido incrementado mes a mes los eventos anteriormente nombrados y al realizar el respectivo análisis de estos eventos de 1 de enero a 25 de noviembre de 2017 -(semana 47) se pudo observar que:

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís y Mocoa son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 47, el departamento presento 9.18 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Villagarzón con 21 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Guzmán 15 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 12 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 11 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 9.38 casos por 10.000 habitantes, y ; entendiéndose que tasa de incidencia es número de casos nuevos en relación a la población riesgo presente en el municipio.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida y trastornos mentales en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, en relación a el evento de conducta suicida el rango de edad se relaciona con la media nacional e internacional, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones



✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja, económicos y maltrato físico son los que mayor incidencia tienen en relación a conducta suicida; y de los cuales los trastornos mentales asociados con más intentos suicidas fue trastorno depresivo, esquizofrenia, e ideación suicida previa persistente

✚ Con respecto a los trastornos mentales que más se presentan en el departamento del Putumayo relacionados con la guía MHGAP se encontró que trastorno de ansiedad y depresión fue el más predominante, seguido de trastornos depresivos, esquizofrenia, junto con trastornos de desarrollo, evidenciando que los rangos de edades con mayor predominio de estos son de, 5-9 años, 10-14 y de 15 a 19 años de edad

✚ Acerca de los trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edad de mayor prevalencia en edades de 15-19 años, y producto con que más llegan a consulta por IPs cannabinoides, cocaína y alcohol

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamuéz, Villagarzón, Puerto Leguizamo, es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de género especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años, seguido de 5 a 9 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que **Ninguno** Es la que más realizan algún tipo de violencia hacia la víctima con un 30%, seguido por pareja con 22.25%, madre con 14.84%, y familiar con 13.87% y

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores fueron elementos como: sin dato con un 61%, contundente, corto contundente con un 27%, otros mecanismos con 5,5%, ahorcamiento, sofocación y estrangulamiento con 2,8%, cortante, punzante y cortó punzante con 2,4%.

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 533 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 77 casos, Otros con 54 casos, espacios terrestres al aire libre con 29 casos, lugares de esparcimiento con expendido de alcohol con 14 casos, centros educativos con 13 casos y establecimiento comercial con 8 casos.

