


BOLETIN N° 22

SEMANA 26 -2018

TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SPA/ALCOHOL, CONDUCTA SUICIDA VIOLENCIAS.





“El buen humor es síntoma de salud mental”

Dómenico Cieri



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 26, 2018 (1 de Enero a 30 de junio)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. TRASTORNO MENTAL.....	5
2.1TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 12	
2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	12
2. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018	16
2.1CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	16
2.2COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO .	17
1.21 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA....	17
2.3DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO.....	19
2.4DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDIENTES – SEXO	20
2.5DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA 20	
2.6DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	21
3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018.....	22
3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	22
3.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017. 23	
3.2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD Y PERTENENCIA ETNICA.....	23
3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	24
3.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	25
3.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	26
3.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	26
CONCLUSIONES	28



LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2018	5
Gráfica 2.Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	15
Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018. .	17
Gráfica 4 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 26.Departamento del Putumayo 2018.	19
Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	19
Gráfica 6. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.	20
Gráfica 7. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	21
Gráfica 8.Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.	23
Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.	25
Gráfica 10. Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	25
Gráfica 11.Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	26
Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	27

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	13
Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	16
Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	22





LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	5
Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	9
Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	9
Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	12
Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	13
Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.....	14
Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	18
Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	21
Tabla 9. Comportamiento Sociodemográfico de violencia de genero según rango de edad pertenecía étnica y sexo. . Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.....	24






1. TRASTORNO MENTAL

En lo transcurrido del año según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental con corte MAYO con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 649 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia , trastorno por uso de alcohol , trastorno por uso de drogas, epilepsia y relacionados ; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales . Tabla N° 1

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2018.

al hacer referencia del número de casos presentado según municipio, se pudo encontrar que el municipio de Mocoa tuvo mayor número de casos con 169 casos, seguido de Puerto Asís con 129 casos, Orito con 69 casos, Valle del Guamuéz con 66 casos, Colon 51 casos los demás municipios se encuentran relacionado en la gráfica número 1.

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNOS MENTALES	MUJERES	HOMBRES	Total general
DELIRIO SUPERPUESTO A UN CUADRO DE DEMENCIA	0	1	1
DEMENCIA , NO ESPECIFICADA	6	0	6
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TEMPRANO (G30.0†)	2	0	2



TRASTORNOS MENTALES	MUJERES	HOMBRES	Total general
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA (G30.9†)	2	0	2
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	5	0	5
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	5	0	5
EPISODIO DEPRESIVO LEVE	32	5	37
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	55	2	57
EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	16	2	18
ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA	1	0	1
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA	5	1	6
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	56	7	63
ESQUIZOFRENIA RESIDUAL	1	1	2
ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	22	11	33
OTRAS DEMENCIAS VASCULARES	1	0	1
OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES	1	4	5
OTROS DELIRIOS	0	1	1
OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	1	1	2
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	6	1	7
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	13	1	14
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	8	4	12
OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES	3	0	3
OTROS TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	0	1
OTROS TRASTORNOS FOBICOS DE ANSIEDAD	2	0	2
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	3	1	4
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS DE ORIGEN NO ORGANICO	1	1	2
PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	2	2	4
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION	18	0	18
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	3	0	3
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO HIPOMANIACO PRESENTE	1	0	1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS	3	0	3
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	2	0	2
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO	4	1	5
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	37	4	41
TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACION EN LA NIÑEZ	1	0	1
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	13	1	14



TRASTORNOS MENTALES	MUJERES	HOMBRES	Total general
TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	2	0	2
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	4	1	5
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA	1	0	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	8	0	8
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	3	0	3
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS	2	0	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	6	0	6
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	15	1	16
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO	2	0	2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	8	0	8
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANIACO	2	0	2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO	1	0	1
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO	7	0	7
TRASTORNO FOBICO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	2	0	2
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	97	0	97
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO DE TIPO ESQUIZOFRENICO	2	3	5
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA	4	0	4
T. M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	0	2
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	3	0	3
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	2	0	2
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: USO NOCIVO	1	0	1
T M Y DEL CO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	15	0	15
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	3	0	3
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	8	0	8
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	0	2
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	6	0	6



TRASTORNOS MENTALES	MUJERES	HOMBRES	Total general
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: USO NOCIVO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME AMNESICO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	7	0	7
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	5	0	5
T MY DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO	2	0	2
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	7	0	7
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T MY DEL CTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1	0	1
T MY DEL CTO DEBIDOS AL USO DE TABACO: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	0	1
T M Y DEL C DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA	2	0	2
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	4	0	4
T MY DEL CTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	0	4
T M Y DEL CTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO	3	0	3
TOTAL GENERAL	592	57	649

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2018.

De los trastornos mentales nombrados en la tabla N° 1, los de mayor prevalencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión con 97 casos, correspondiente al 14.94%, seguido de esquizofrenia paranoide con 9.7%, y de episodio depresivo moderado con 9%.

En cuanto al rango de edad, los grupos de mayor prevalencia fueron 15-19 años con 14.79%, 20-24; 25-29 años de edad con 9.55 %.

Para cada rango de edad, de 30-34 años con 9.40%. Los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2.



Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.

RANGO EDAD	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
0-4		3	3
5-9		11	11
10-14	1	37	38
15-19	6	90	96
20-24	11	51	62
25-29	6	56	62
30-34	8	53	61
35-39	4	46	50
40-44	2	39	41
45-49	2	40	42
50-54	2	34	36
55-59	3	39	42
60-64	4	30	34
65-69	1	22	23
70-74	2	17	19
75-79	3	11	14
80-84	2	7	9
85-89		3	3
90-94		3	3
Total general	57	592	649

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte abril -Año 2018.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL	15-19	20-24	25-29	Total general
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	1	1		2
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1			1
EPISODIO DEPRESIVO LEVE	7	5	2	14
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	12	1	1	14
EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	4		1	5
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		1	2	3
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	2	5	11	18
ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	1	4	8	13
OTRO TRASTORNO PSICOTICO AGUDO, CON PREDOMINIO DE IDEAS DELIRANTES		1	1	2
OTROS DELIRIOS		1		1
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	1		1	2
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	2	2	1	5
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	2			2
OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES		1		1



TRASTORNO MENTAL	15-19	20-24	25-29	Total general
OTROS TRASTORNOS FOBICOS DE ANSIEDAD		1		1
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1		2
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS DE ORIGEN NO ORGANICO	1			1
PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	2	1	1	4
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION		3	3	6
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO		1		1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS	2			2
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS		1		1
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	4	3	4	11
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	1		1	2
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	1		1	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1		1	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS			1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE			2	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE			2	2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	1	1		2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANIACO		2		2
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	9	7	7	23
TRASTORNO PSICOTICO AGUDO DE TIPO ESQUIZOFRENICO	2	3		5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	1		2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	1		1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	11	1	1	13
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO		3		3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	6	1	1	8
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	1	1	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: USO NOCIVO		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME AMNESICO	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1			1

TRASTORNO MENTAL	15-19	20-24	25-29	Total general
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	1		5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	3		1	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		2		2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1	1		2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	2		1	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA			1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO		1		1
Total general	96	62	62	220

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Mayo. Año 2018.

A nivel general se encontró que los trastornos mentales con mayor incidencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión, seguido de esquizofrenia y trastorno depresivo según los rangos de edad se encontraron:

- ✓ **15-19 años:** se encontraron 96 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron trastorno depresivo moderado con 12 casos seguido de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides: con 11 casos síndrome de dependencia, y trastorno mixto de ansiedad y depresión con 9 casos.
- ✓ **25-29 años:** se encontraron 62 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; Trastorno mixto de ansiedad y depresión, esquizofrenia paranoide y episodio depresivo leve con 5 casos para cada uno.
- ✓ **30-34 años:** se encontraron 62 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; esquizofrenia paranoide con 11 casos seguido de esquizofrenia no especifica con 8 casos y por ultimo trastorno mixto de ansiedad y depresión con 7 casos.

Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 7.



Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.

EAPB	H	M	Total general
SIN INFORMACION	7	87	94
INSTITUTO SEGUROS SOCIALES		1	1
COOMEVA		1	1
NUEVA EPS	2	11	13
MEDIMAS	4	33	37
AIC	3	42	45
MAYAMAS	1	76	77
EMSSANAR	37	291	328
POLICIA		4	4
SANIDAD MILITAR	1	5	6
UNIMAP	2	41	43
Total general	57	592	649

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Mayo. Año 2018.

Al observar los trastornos mentales según EAPB, se puede decir que EMSSANAR en la EAPB con mayor cosas de trastornos mentales con 323 casos, seguido de MAYAMAS con 77 casos, AIC con 45 casos, y UNIMAP con 43 casos, en relación a no afiliados se encontró 94 casos como lo muestra en la tabla 4.


2.1 TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 108 casos, según RIPS (corte mayo) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 75.93% (82 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 24% (26 casos). Mapa 1.



Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo. Año 2018.

En cuanto al rango de edad, se encontró que los de mayor prevalencia se encontraron de 15-19 años con 39.8% (n=43), 20-24 años con 15.74%(n=17), 25-29 años con 12% (n=13). Los demás rangos de edad se encuentran la tabla 8.

Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018

rango edad	Hombres	Mujeres	Total general
10-14	3	5	8
15-19	12	31	43
20-24	3	14	17
25-29	2	11	13
30-34	4	8	12
35-39		3	3
40-44		1	1
45-49	2	3	5
50-54		2	2
55-60		4	4
Total general	26	82	108

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo. Año 2018.



Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples drogas y alcohol; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **síndrome de dependencia** fue alcohol con 16 casos, seguido de cocaína, **uso nocivo** fue múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 8 casos, **intoxicación aguda** alcohol con 4 casos para cada sustancia.

Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2018.


TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	Hombres	Total
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA		2	2
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA		3	3
ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1		1
ALUCINOGENOS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	2	3
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO		1	1
ALUCINOGENOS: USO NOCIVO	1		1
CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1
CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	1	1	2
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	12	16
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	1	2	3
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	2	6	8
COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		2	2
COCAINA: INTOXICACION AGUDA		1	1
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA		7	7
COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
COCAINA: USO NOCIVO		1	1
DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME AMNESICO	1		1
DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1
DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1		1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA		1	1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	1	6	7

TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SPA	Mujeres	Hombres	Total
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	2	3	5
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		2	2
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	2	2	4
OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	1	2	3
OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1		1
SEDANTES O HIPNOTICOS: INTOXICACION AGUDA	1		1
TABACO: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1
ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA		2	2
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	1	3	4
ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	4	8
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
ALCOHOL: USO NOCIVO		3	3
Total general	26	82	108

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Mayo. Año 2018.

En el caso de las EAPBs en las cuales se encuentran afiliados con mayor población se encuentra emssanar con 58 casos, seguido de sin información con 17 casos, MALLAMAS 13 casos, AIC 10 casos, MEDIMAS con 5 casos, UNIMAP 3 casos, Nueva EPS 1 caso, Fuerzas militares 1 caso muestra la gráfica 1.

Gráfica 2.Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte mayo. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo Mayo , Año 2018.




2. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018

2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 20 del año 2018) con registro de las siguientes IPS del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 160 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 35 casos, Mocoa 31 casos , Orito 15 casos, Valle del Guamuez 15 casos, Villagarzón 14 casos, san miguel (la dorada) 10 casos, Sibundoy 9 casos, Puerto Leguizamo 6 casos, Colon 5 casos, Puerto Guzmán 5 casos, Puerto Caicedo con 4 casos , Santiago 4 casos, San Francisco 3 casos, otros departamentos 4 casos. Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26 . Año 2018.



Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Mocoa se han presentado a la fecha 6.95 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 6.54 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Asís con 5.62 casos por 10.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo la cual es 4.46 casos por 10.000 habitantes, por debajo de la tasa de incidencia de Putumayo se encuentra, puerto Leguizamo con 3.90 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 3.53 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz 2.80 casos por 10.000 habitantes, Orito con 2.66 casos por 10.000 habitantes, Colon con 0.88 por 10.000 habitantes, Sibundoy con 0.63 por 10.000 habitantes, Santiago con 0.37 por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 0.27 por 10.000 habitantes, Puerto Guzmán con 0.21 por 10.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 3.

Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

2.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

1.21 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.



Para corte semana 26, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 100 casos para un equivalente de 62.5 %, en mujeres 60 casos para un equivalente de 39.3%.

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;

Al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 24 casos, de 15-19 años de edad con unos 36 casos, de 20 -24 años de edad con 16 casos, de 25-29 con 15 casos.

En relación a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 20-24 años de edad con 19 casos, de 15-19 años con 18 casos, y de 25-29 años con 9 casos. Ver tabla Numero 7.

Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima.
Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.

Rango edad	Mujeres	Hombres	Total general	Porcentaje
10-14	24	4	28	17,50
15-19	36	18	54	33,75
20-24	16	19	35	21,88
25-29	15	9	24	15,00
30-34	2	2	4	2,50
35-39	3	5	8	5,00
40-44	1	0	1	0,63
45-49	1	1	2	1,25
50-54	0	1	1	0,63
60-64	1	0	1	0,63
65-69	1	0	1	0,63
70-75	0	1	1	0,63
Total general	100	60	160	100

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo.
Corte semana 26 . Año 2018.

De los 160 casos reportados el 70 % (n=112) no tuvieron intentos previos, el 15% (n= 24) tuvieron 1 intentos previos (mujeres n=14 y hombres n= 10), el 11.25% (n= 18) tuvieron dos intentos previos (mujeres n=12 y hombres n=6), tres intentos previos con 1.8 % (n=3) (mujeres n= 1, hombres n= 2), 1,8% (n=3) cuatro intentos previos (mujeres n=2, hombres n=1) como lo muestra la gráfica número 4.

Gráfica 4 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

2.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 17 indígenas, de las cuales son 7 mujeres y 10 hombres, 2 Afrocolombianos, 2 hombres, otro 141 casos de los cuales 93 mujeres y 48 hombres. Ver Gráfico número 5.

Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENCADENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 49.3% (mujeres n=45, hombres n=34) fue problemas de pareja, seguido de problemas económicos 8.7% (mujeres n= 7, hombres n=7), maltrato físico 7.5% (mujeres n= 10, hombres n=2), problemas escolares con 6.25 % (mujeres n=8, hombres n=2), muerte de un familiar 4.3% (mujeres n= 5, hombres n= 2), enfermedades crónicas 1.8% (mujeres n= 2 ,hombres n=1), suicidios de un familiar 1.25 % (mujeres n=2), problemas laborales 1.25% (mujeres n= 1, hombres n=1), problemas jurídicos 0.62% (hombres n=1),. Grafica 6.

Gráfica 6. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

2.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 127 casos 29 (22%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental relacionado a trastornos psiquiátricos; de las persona con trastorno psiquiátrico asociados el más común es el trastorno depresivo, con un 62%, tabla número 7.

Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.

Trastorno psiquiátrico	Mujeres	Hombres	Total general	Porcentaje en relación al grupo	Porcentaje en relación a total de casos
Trastorno depresivo	20	9	29	80,56 %	18,12%
Trastorno de personalidad	1	1	2	5,56%	1,25%
Trastorno bipolar	2	0	2	5,56%	1,25%
Esquizofrenia	1	2	3	8,33%	1,87%

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

2.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 26 de 2018 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 76.8 % (mujeres n=83, hombres n=40), arma corto punzante con 15.6% (mujeres n=13, hombres n=12), seguido de ahorcamiento con 2% (mujeres n=2, hombres n=3). Ver grafica número 7.

Gráfica 7. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

3. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018

3.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 26 año 2018, se encuentran 418 casos; de los cuales 22 casos son de residencia otros departamentos; los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Valle del Guamuéz 71 casos, Mocoa con 65 casos, Puerto Asís con 53 casos, Villagarzón con 44 casos, Puerto Leguizamo 33 casos, Orito 32 casos, Puerto Guzmán 27 casos, Sibundoy 20 casos, Puerto Caicedo con 12 casos, Santiago 12 casos, Colon 10 casos, San Miguel 10 casos, San Francisco 4 caso. Municipio desconocido de Putumayo 3 casos. Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018


Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se presentaron 19.16 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 13.67 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 13.42 casos por 10.000 habitantes, se encuentran por encima de la tasa de incidencia de Putumayo, la cual es de 11.65 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 8.52 casos por 10.000 habitantes, Colon 8.14 casos por 10.000 habitantes, Orito con 5.68 casos por 10.000 habitantes, Puerto



Leguizamo 3.90 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 2.82 casos por 10.000 habitantes, los demás municipios en menor tasa de incidencia se encuentran en la gráfica número 8.

Gráfica 8. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

3.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.

3.2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD Y PERTENENCIA ÉTNICA

De los 418 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 86% (n=360) fueron Mujeres y el 14% (n=58) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 18 casos, y de 10-14 años con 13 casos; en relación a pertenecía étnica se encontró que el 15.5 % son indígenas, y el 81% pertenecen a otras etnias.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 73 casos, 15-20 años de edad con 46 casos, 20-24 años de edad con 38



casos, en relación a pertenecía étnica se encontró que el 14 % son indígenas, y el 84% pertenecen a otras etnias, los demás rangos se evidencian en la tabla 9.

Tabla 9. Comportamiento Sociodemográfico de violencia de genero según rango de edad pertenecía étnica y sexo. . Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.

Mujeres					Total Mujeres	Hombres			Total hombres
Rango edad	Indígena	Rom	Afrocolombiano	Otros		Indígena	Afrocolombiano	Otros	
0-4	5		1	17	23	4		14	18
5-9	1			32	33	2		4	6
10-14	14		3	73	90	2	1	10	13
15-19	6			46	52			5	5
20-24	5		1	38	44	1		2	3
25-29	6			29	35				
30-34	8	1		18	27		1	1	2
35-39	1			17	18				
40-44	1			14	15			2	2
45-49	1			6	7			2	2
50-54	2			3	5			1	1
55-59				2	2			1	1
60-64				4	4				
65-69				1	1			1	1
70-74	1			1	2			2	2
75-79				1	1			1	1
85-89				1	1			1	1
Total general	51	1	5	303	360	9	2	47	58

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018

3.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con abuso sexual con 156 casos seguido de Violencia física con 151 casos, Negligencia y abandono 19 casos, violación con 15 casos y; en relación a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 29 casos, seguido de violencia física con 18 casos, abuso sexual con 9 casos. Ver grafica 9.

Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

3.4 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al revisar el tipo de agresor familiar hacia la víctima, se encontró que, la pareja fue el mayor agresor como causante de violencia en las mujeres con un 30% (n=127), de agresores externos a familiar (ninguno) con un 27% (n=117), familiar 12% (n=51), Expareja 8.6% (n= 23), madre 5.2 % (n=14), padre 4.5% (n = 4.5); en relación a los hombres se encontró que el agresor con mayor incidencia que vulnera los derechos del niño fue la madre con 6.4% (n=27), fuera del ámbito familiar (ninguno) con 4% (n= 17), familiar con 0.16% (n=7), padre y pareja con 0.7 % (n=3) para cada uno. Ver grafica 10.

Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26 . Año 2018.

3.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 59%, seguido de contundentes/corto contundente con un 26%, Otros mecanismos 6.2%, ahorcamiento con un 3.1%, Cortante/ corto punzante/Punzante con un 2.6% como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11. Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.

3.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 75.5 % (mujeres n= 280 y hombres n= 36); vía publica 9.8% (mujeres n=30 hombres n=11), otro con 7.8% (mujeres n= 29, hombres n=4), espacio terrestre con 2.8% (n=12), lugar de esparcimiento y establecimiento comercial con 1% para cada uno. Ver gráfico 12.



Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 26. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 26. Año 2018.





CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: intento suicida, Violencia, para los eventos de trastornos mentales y consumo de SPA se emitirán a partir del siguiente boletín puesto que la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS; y hasta el momento no ha sido posible su recepción por un cambio de aplicativo que está realizando el instituto nacional de salud al programa SIVIGILA, por consiguiente al analizar el evento de Intento suicida y violencia en el departamento del Putumayo a semana epidemiológica 26 (1 de Enero al 30 de junio de 2018) se encontró lo siguiente:

✚ Con respecto a los trastornos mentales que más se presentan en el departamento del Putumayo relacionados con la guía MHGAP se encontró que trastornos mixto de ansiedad y depresión fue el trastorno mental con mayor número de casos, seguido de esquizofrenia, y episodio depresivo moderado, evidenciando que los rangos de edades con mayor predominio de estos son de, 15 a 19, 20-24 y de 25-29 años de edad

✚ Acerca de los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edad de mayor prevalencia en edades de 15-19 años, y 20-24 años de edad encontrándose sustancias como cannabinoides, cocaína, y el uso de múltiples drogas

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís, Mocoa, Orito, Valle del Guamuéz, son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 26, el departamento presento 4.46 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Villagarzón con 6.54 casos por 10.000 habitantes, seguido de Puerto Asís con 5.62 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 6.95 casos por 10.000 habitantes, y San Miguel con 3.53 casos por 10.000 habitantes.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja, y económicos, son los que mayor prevalencia tienen; en relación a presentar una conducta suicida se presentó que un 30% de los casos que presentaron intentos suicidas, tuvieron entre 1 -2 -4 intentos previos.

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Villagarzón, Moca y Valle del Guamuéz presentan mayor tasa de incidencia; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una





imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ la pareja fue el mayor agresor como causante de violencia en las mujeres con un 30% (n=127), de agresores externos a familiar (ninguno) con un 27% (n=117), familiar 12% (n=51), Expareja 8.6% (n= 23),madre 5.2 % (n=14), padre 4.5% (n = 4.5); en relación a los hombres se encontró que el agresor con mayor incidencia que vulnera los derechos del niño fue la madre con 6.4% (n=27), fuera del ámbito familiar (ninguno) con 4% (n= 17), familiar con 0.16% (n=7), padre y pareja con 0.7 % (n=3) para cada uno.

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores fueron elementos como: sin información 59%, seguido de contundentes/corto contundente con un 26%, Otros mecanismos 6%, ahorcamiento con un 3%, Cortante/ corto punzante/Punzante con un 2%

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 316 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 41 casos, y Otros con 33 casos.

