

BOLETIN Nº 24

SEMANA 39 -2018

TRASTORNOS MENTALES, CONSUMO DE SPA/ALCOHOL, CONDUCTA SUICIDA VIOLENCIAS.



OBSERVATORIO
DE SALUD MENTAL
PUTUMAYO



“El buen humor es síntoma de salud mental”

Dómenico Cieri



OBSERVATORIO

De salud mental Putumayo

observatorio.smputumayo@hotmail.com

Corte semana epidemiología 39, 2018 (1 de Enero a 29 de septiembre)

Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública





TABLA DE CONTENIDO

1. TRASTORNO MENTAL.....	5
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 12	
2.1CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 12	
3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018	16
3.1CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	16
3.2COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCT SUICIDA DEL DEPARTAMENTO ...	18
3.2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA. 18	
3.3DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO.....	20
3.4DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO	20
3.5DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA 21	
3.6DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	22
3.722	
4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018.....	22
4.1VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	22
4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2018. 24	
4.2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	24
4.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA - SEXO.	25
4.4 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO 26	
4.5 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	27
4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	27
4.7 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	28
CONCLUSIONES	30



LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2018	5
Gráfica 2.Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte septiembre Departamento del Putumayo.....	16
Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018. .	18
Gráfica 4. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 39.Departamento del Putumayo 2018.	19
Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	20
Gráfica 6. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.	21
Gráfica 7. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	22
Gráfica 8.Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.	24
Gráfica 9. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	25
Gráfica 10. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 39 Departamento del Putumayo 2018.....	25
Gráfica 11. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	26
Gráfica 12. Relación victima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	27
Gráfica 13.Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	28
Gráfica 14. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	29

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018.....	13
Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	17
Mapa 1. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	23



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.....	5
Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Junio. Departamento del Putumayo 2018.....	8
Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.....	9
Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.....	12
Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.....	13
Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018. ...	14
Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	19
Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.....	21






1. TRASTORNO MENTAL

En lo transcurrido del año según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental con corte septiembre con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 1264 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia, trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de drogas, epilepsia y relacionados; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales. grafica N° 1

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2018



fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre -Año 2018.

Al hacer referencia del número de casos presentado según municipio, se pudo encontrar que el municipio de Mocoa tuvo mayor número de casos con 312 casos, seguido de Puerto Asís con 196 casos, Valle del Guamuéz con 138 casos, Colon 127 casos, Orito con 119 casos, Sibundoy 107, los demás municipios se encuentran relacionado en la gráfica número 1.

Tabla 1. Trastornos mentales. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNOS MENTALES	Mujeres	Hombres	Total general
DEMENCIA , NO ESPECIFICADA	8	7	15
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDIO (G30.1†)	5	1	6
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TEMPRANO (G30.0†)	1	1	2



TRASTORNOS MENTALES	Mujeres	Hombres	Total general
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA (G30.9†)	8	2	10
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20†)		1	1
DEMENCIA VASCULAR MIXTA, CORTICAL Y SUBCORTICAL	2		2
DEMENCIA VASCULAR, NO ESPECIFICADA	1	1	2
DEPRESION POSTESQUIZOFRENICA	1	1	2
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	2	3	5
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	4	1	5
EPISODIO DEPRESIVO LEVE	62	19	81
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	71	28	99
EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	27	8	35
ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA	1		1
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA	1	8	9
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	43	76	119
ESQUIZOFRENIA RESIDUAL		1	1
ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	13	28	41
OTRAS ESQUIZOFRENIAS	3	1	4
OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	8	4	12
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES	7	1	8
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	18	13	31
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	11	9	20
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NIÑEZ		3	3
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	2	5	7
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	7	19	26
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	1	1	2
OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS RECURRENTES	1	1	2
OTROS TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1		1
OTROS TRASTORNOS FOBICOS DE ANSIEDAD	2		2
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	5	7
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION	41	16	57
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS		1	1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	5	2	7
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO HIPOMANIACO PRESENTE	1		1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS	2	5	7
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MIXTO PRESENTE	1		1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO	11	4	15
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	61	43	104
TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACION EN LA NIÑEZ	3	4	7
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	31	9	40
TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	3		3
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO	1	1	2



TRASTORNOS MENTALES	Mujeres	Hombres	Total general
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA		1	1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	8		8
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	5		5
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SINTOMAS PSICOTICOS	1	1	2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	6		6
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	23	12	35
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO	3	1	4
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	13	3	16
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANIACO	6	3	9
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO	1		1
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO	4	6	10
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	177	56	233
TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	4	3	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	2	4	6
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	3	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	1	4	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	3	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	16	18
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	1	1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	4	6	10
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA		3	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	6	8
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO		2	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: INTOXICACION AGUDA	2		2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1		1



TRASTORNOS MENTALES	Mujeres	Hombres	Total general
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		3	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA		4	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2	1	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA		3	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	2	7	9
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1	3	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	1	2	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	2	5	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO	1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO		2	2
Total general	754	509	1263

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Septiembre -Año 2018.

De los trastornos mentales nombrados en la tabla N° 1, los de mayor prevalencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión con 98 casos, correspondiente al 18%, seguido de esquizofrenia paranoide con 9%, y en tercer lugar episodios depresivo moderado junto con trastorno de ansiedad , no especificado con 9%.

En cuanto al rango de edad, los grupos de mayor prevalencia fueron 15-19 años de edad con 14%, 30-34 años de edad con 10%, 25-29 años de edad con 9. %. Los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2.

Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Junio. Departamento del Putumayo 2018.

Rango edad	Mujeres	Mujeres	Total general
0-4	5	9	14
5-9		22	34
10-14		41	102
15-19		88	172



Rango edad	Mujeres	Mujeres	Total general
20-24	49	46	95
25-29	59	60	119
30-34	71	55	126
35-39	67	33	100
40-44	49	22	71
45-49	64	15	79
50-54	61	27	88
55-59	47	21	68
60-64	33	21	54
65-69	31	9	40
70-74	18	14	32
75-79	22	13	35
80-84	11	9	20
85-89	7	3	10
90-94	2	1	3
95-99	1		1
Total general	754	509	1263

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre -Año 2018.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL	15-19	25-29	30-34	Total general
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	1	1		2
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	1	2	1	4
EPISODIO DEPRESIVO LEVE	16	3	8	27
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	25	6	6	37
EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO	4	1	4	9
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA	1	3	1	5
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	4	18	19	41
ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA	3	9	9	21
OTRAS ESQUIZOFRENIAS	2	1		3
OTROS EPISODIOS DEPRESIVOS	3			3
OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES		3	2	5
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS	3	2	5	10
OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD MIXTOS	4		2	6
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	1			1
OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	2		4
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION	4	7	2	13



TRASTORNO MENTAL	15-19	25-29	30-34	Total general
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	1			1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE CON SINTOMAS PSICOTICOS	2	1	1	4
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO	1	1	3	5
TRASTORNO DE ANSIEDAD , NO ESPECIFICADO	14	14	16	44
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	4	3	8	15
TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL EN LA NIÑEZ	1			1
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORGANICO		1	1	2
TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA		1		1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	1			1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE		2		2
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	3	3	4	10
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO		1		1
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO		1	1	2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANIACO		2		2
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO	1			1
TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	25	19	21	65
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	2	1	1	4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1		2	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	2			2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	3			3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	9	1	2	12
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: USO NOCIVO	7			7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: INTOXICACION AGUDA		1	1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	3	3	1	7
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO	1		1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: INTOXICACION AGUDA	2			2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		1		1



TRASTORNO MENTAL	15-19	25-29	30-34	Total general
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	2			2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	4			4
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1		1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: SINDROME DE DEPENDENCIA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEINA: INTOXICACION AGUDA	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	1		1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SINDROME DE DEPENDENCIA	1		2	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1			1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: USO NOCIVO		1		1
Total general	172	119	126	417

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Septiembre .Año 2018.

A nivel general se encontró que los trastornos mentales con mayor incidencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión, seguido de esquizofrenia y trastorno depresivo según los rangos de edad se encontraron:

- ✓ **15-19 años:** se encontraron 172 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron los trastornos asociados a consumo de sustancias psicoactivas para un total de 45, seguido de trastorno depresivo moderado y trastorno mixto de ansiedad y depresión con 25 casos, depresivo leve con 16 casos
- ✓ **25-29 años:** se encontraron 119 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; Trastorno mixto de ansiedad y depresión con 19 casos, esquizofrenia paranoide con 18 trastorno de ansiedad con 14 casos.
- ✓ **30-34 años:** se encontraron 126 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; Trastorno mixto de ansiedad y depresión con 21 casos, esquizofrenia paranoide con 19 casos seguido trastorno de ansiedad con 16 casos.

Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 7.



Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018.

EAPB	Mujeres	Hombres	Total general
SIN INFORMACION	51	33	84
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AICEPSII	78	64	142
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S.		1	1
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS		1	1
ASOCIACION SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO ESS "EMSSANAR ESS"	431	293	724
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE PUTUMAYO	2	2	4
ECOPETROL		1	1
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	70	37	107
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	42	16	58
FUERZAS MILITARES	2	8	10
NUEVA EPS S.A.	21	16	37
POLICÍA NACIONAL	3	5	8
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2		2
MEDIMAS	51	31	82
DIRECCIÓN MUNICIPAL COLON	1	1	2
Total general	754	509	1263

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. septiembre. Año 2018.

Al observar los trastornos mentales según EAPB, se puede decir que EMSSANAR en la EAPB con mayores casos de trastornos mentales con 724 casos, seguido de AIC con 142 usuarios con trastornos mentales, MALLAMAS con 107 casos, y UNIMAP con 58 casos, sin información se encontró 84 casos como lo muestra en la tabla 4.


2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 121 casos, según RIPS (corte septiembre) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 72% (131 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 28% (52 casos). Mapa 1.



Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre . Año 2018.

En cuanto al rango de edad, se encontró que los de mayor prevalencia se encontraron de 15-19 años con 38% (n=69), 20-24 años con 15%(n=28), 10-14 años con 13% (n=23). Los demás rangos de edad se encuentran la tabla 8.

Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Septiembre. Departamento del Putumayo 2018

Rango Edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
10-14	10	5%	13	7%	23	13%
15-19	23	13%	46	25%	69	38%
20-24	4	2%	24	13%	28	15%
25-29	3	2%	15	8%	18	10%
30-34	5	3%	14	8%	19	10%
35-39	2	1%	5	3%	7	4%
40-44		0%	1	1%	1	1%
45-49	4	2%	4	2%	8	4%
50-54		0%	4	2%	4	2%
55-59		0%	4	2%	4	2%
60-64		0%	1	1%	1	1%
75-79	1	1%		0%	1	1%
Total general	52	28%	131	72%	183	100%

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte septiembre . Año 2018.



Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples drogas y alcohol; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **síndrome de dependencia** fue Cannabinoides con 16 casos, seguido de cocaína, **uso nocivo** fue cannabinoides con 15 casos y múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 13 casos, **intoxicación aguda** alucinógenos con 7 casos para cada sustancia.

Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte septiembre. Departamento del Putumayo 2018.

TRASTORNO MENTAL ASOCIADO A	MUJERES	HOMBRES	Total general	%
ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	1	2	1%
ALUCINOGENOS: INTOXICACION AGUDA	3	4	7	4%
ALUCINOGENOS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1	1%
ALUCINOGENOS: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1	1%
ALUCINOGENOS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	1	2	1%
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO		1	1	1%
ALUCINOGENOS: TRASTORNO PSICOTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDIO		1	1	1%
ALUCINOGENOS: USO NOCIVO	1		1	1%
CANNABINOIDES: ESTADO DE ABSTINENCIA	1	4	5	3%
CANNABINOIDES: INTOXICACION AGUDA	2	4	6	3%
CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	3	4	2%
CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA	7	21	28	15%
CANNABINOIDES: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		1	1	1%
CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICOTICO	1	2	3	2%
CANNABINOIDES: USO NOCIVO	4	11	15	8%
COCAINA: ESTADO DE ABSTINENCIA		3	3	2%
COCAINA: INTOXICACION AGUDA		4	4	2%
COCAINA: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1	1%
COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	4	8	12	7%
COCAINA: TRASTORNO PSICOTICO		2	2	1%
DISOLVENTES VOLATILES: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1	1%
DISOLVENTES VOLATILES: INTOXICACION AGUDA	2		2	1%
DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME AMNESICO	1		1	1%
DISOLVENTES VOLATILES: SINDROME DE DEPENDENCIA		1	1	1%
DISOLVENTES VOLATILES: USO NOCIVO	1		1	1%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		4	4	2%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: INTOXICACION AGUDA		4	4	2%




TRASTORNO MENTAL ASOCIADO A	MUJERES	HOMBRES	Total general	%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2	1	3	2%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SÍNDROME DE DEPENDENCIA	1	8	9	5%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	5	8	13	7%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICOTICO		3	3	2%
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: USO NOCIVO	1	7	8	4%
USO DE OPIACEOS: INTOXICACION AGUDA	2		2	1%
OPIACEOS: SÍNDROME DE DEPENDENCIA		1	1	1%
OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFEÍNA: INTOXICACION AGUDA	2		2	1%
SEDANTES O HIPNÓTICOS: INTOXICACION AGUDA	1		1	1%
TABACO: SÍNDROME DE DEPENDENCIA		1	1	1%
ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA		1	1	1%
ALCOHOL: ESTADO DE ABSTINENCIA CON DELIRIO		1	1	1%
ALCOHOL: INTOXICACION AGUDA	3	3	6	3%
ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO		1	1	1%
ALCOHOL: SÍNDROME DE DEPENDENCIA	3	7	10	5%
ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	1	1	2	1%
ALCOHOL: TRASTORNO PSICOTICO	1		1	1%
ALCOHOL: USO NOCIVO		4	4	2%
Total general	52	131	183	100%

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte septiembre. Año 2018.

En el caso de las EAPBs en las cuales se encuentran afiliados con mayor población se encuentra Emssanar con 95 casos equivalente a 52%, seguido de MALLAMAS con 22 casos con 12%, AIC 20 casos con 11%, MEDIMAS con 10 casos correspondiente al 5%, UNIMAP 6 casos, 3%, Fuerzas militares 3 caso con 2%, Nueva EPS 2 caso con 1%, muestra la gráfica 2.



Gráfica 2.Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte septiembre Departamento del Putumayo




Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo Septiembre , Año 2018.

3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018

3.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 39 del año 2018) con registro de las siguientes IPSs del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 256 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 50 casos, Mocoa 48 casos , Valle del Guamuez 27 casos, Villagarzón 23 casos, Orito 22 casos, Puerto Leguizamo 19 casos, san miguel (la dorada) 16 casos, Sibundoy 13 casos, Puerto Guzmán 8 casos, Puerto Caicedo con 8 casos, Santiago 6 casos, Colon 6 casos, San Francisco 3 casos, otros departamentos 7 casos. Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39 . Año 2018.

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 12.35 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 10.75 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 10.75 casos por 10.000 habitantes, Colon con 10.65 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy 9.03 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 8.03 casos por 10.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo. Por debajo del departamento se encuentra, Santiago con 5.57 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 5.56 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 5.43 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuez con 5.03 casos por 10.000 habitantes, San Francisco con 4.17 casos por 10.000 habitantes, Orito con 3.9 casos por 10.000 habitantes, y Puerto Guzmán con 3.31 casos por 10.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 3.

Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39 . Año 2018.

3.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

3.2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 39, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 160 casos para un equivalente de 62 % en mujeres y en hombres 96 casos para un equivalente de 37%

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;

Al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 33 casos (12.89%), de 15-19 años de edad con unos 62 casos (24.22%), de 20 -24 años de edad con 27 casos (10.55%), de 25-29 con 22 casos (8.59%).



En relación a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 15-19 años con 30 casos (11.72%), de 20-24 años de edad con 26 casos (10.16%), y de 25-29 años con 16 casos (6.25%). Ver tabla Numero 7.


Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.

rango edad	mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
10-14	33	12,89	7	2,73	40	15,63
15-19	62	24,22	30	11,72	92	35,94
20-24	27	10,55	26	10,16	53	20,70
25-29	22	8,59	16	6,25	38	14,84
30-34	4	1,56	4	1,56	8	3,13
35-39	6	2,34	7	2,73	13	5,08
40-44	1	0,39	0	0,00	1	0,39
45-49	3	1,17	2	0,78	5	1,95
50-54	0	0,00	1	0,39	1	0,39
55-59	0	0,00	1	0,39	1	0,39
60-64	1	0,39	0	0,00	1	0,39
65-69	1	0,39	0	0,00	1	0,39
70-75	0	0,00	2	0,78	2	0,78
Total general	160	62,50	96	37,50	256	100,00

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39 . Año 2018.

De los 256 casos reportados el 70 % (n=179) no tuvieron intentos previos, el 13% (n= 33) tuvieron 1 intentos previos (mujeres n=21 y hombres n= 12), el 11.3% (n= 29) tuvieron dos intentos previos (mujeres n=21 y hombres n=8), tres intentos previos con 2.3 % (n=6) (mujeres n= 4, hombres n= 2), 2.7% (n=7) cuatro intentos previos (mujeres n=5, hombres n=2) como lo muestra la gráfica número 4.

Gráfica 4. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 30 indígenas, de las cuales son 17 mujeres y 13 hombres, 2 Afrocolombianos, 2 hombres, otro 224 casos de los cuales 143 mujeres y 81 hombres. Ver Gráfico número 5.

Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

3.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 52.7% (mujeres n=79, hombres n=56) fue problemas de pareja, seguido de problemas de consumo de sustancias psicoactivas con 12.5% (mujeres n=13 hombres n=19), maltrato físico con 8.20%, (mujeres n= 18, hombres n= 3), problemas escolares con 7.8%, (mujeres n= 16, hombres n= 4), problemas económicos con 7.42 %, (mujeres n= 10, hombres n= 9, muerte de un familiar con 5.47% (mujeres n=10, hombres n= 4), enfermedad crónica con 2.34% (mujeres n= 3, hombres n=3), suicidio de un familiar con 1.17% (mujeres n= 3), problemas laborales con 1.17% (mujeres n= 1, hombres n= 2), problemas legales con 0.39 % (hombres n= 1). Gráfica 6.

Gráfica 6. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 256 casos, 51 (20%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental relacionado a trastornos psiquiátricos; de las persona con trastorno psiquiátrico asociados el más común es el trastorno depresivo, con un 74.51%, seguido de trastorno bipolar con 9.80%, como lo muestra la tabla número 7.

Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.

Trastorno psiquiátrico	mujeres	Hombres	Total general	Porcentaje en relación al grupo	porcentaje en relación a total de casos
Trastorno depresivo	27	11	38	74,50	14,84
Trastorno de bipolaridad	5	0	5	9,80	1,95
Trastorno de personalidad	3	1	4	7,84	1,56
Esquizofrenia	2	2	4	7,84	1,56

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.




3.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

3.7

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 39 de 2018 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 76 % (mujeres n=128, hombres n=69), arma corto punzante con 17% (mujeres n=26, hombres n=17), seguido de ahorcamiento con 2.7% (mujeres n=3, hombres n=4). Ver grafica número 7.

Gráfica 7. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018


4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 39 año 2018, se encuentran 635 casos; de los cuales 29 casos son de residencia de otros Departamentos; los eventos con residencia en el Departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Mocoa con 101 casos, Valle del Guamuéz con 98 casos, Puerto Asís con 84 casos, Villagarzón con 59 casos, Orito con 51 casos, Puerto Leguizamo con 46 casos, Puerto Guzmán con 45 casos, Sibundoy 40 casos, Santiago con 20 casos, Puerto Caicedo y Colon



con 18 casos cada municipio, San Miguel con 15 casos y San Francisco con 7 casos; Ver Mapa 1.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Puerto Leguízamo se presentaron 29.9 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy con 27.8 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 27.6 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 22.6 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán y Santiago con 18.6 casos por municipio por 10.000 habitantes, Valle del Guamuez con 18.3 casos por 10.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia de Putumayo, la cual es de 16.8 casos por 10.000 habitantes, por debajo de esta tasa le siguen los siguientes municipios: Puerto Asís con 13.5 casos por 10.000 habitantes, Puerto Caicedo con 12.2 casos por 10.000 habitantes, Orito con 9 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 5.3 casos por 10.000 habitantes

En cuanto a Colon y San Francisco como son municipios que no superan los 10.000 habitantes, su tasa de incidencia se presenta por 1.000 habitantes para no inferir y no supra estimar el resultado, la cual corresponde a Colon con 3.2 casos por 1.000 habitantes, San Francisco con 1 caso por 1.000 habitantes; Ver gráfica 8.

Gráfica 8. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2018.


4.2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 635 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 85% (n=539) fueron Mujeres y el 15% (n=96) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 27 casos, de 10-14 años con 16 casos y de 5-9 años con 13 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años con 134 casos, de 15-29 años con 78 casos, 20-24 años con 65 casos; Los demás rangos se evidencian en la Grafica 9.

Gráfica 9. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018

4.3 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA - SEXO.

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 13,4 son indígenas (72 Mujeres – 13 Hombres), 1,7 % son Afrocolombianos (8 Mujeres – Hombre 1), 0,3% son ROM (2 Mujeres – 0 Hombres), 0,3 % son Raizal (2 Mujeres – 0 Hombres) y 84,3 % otros (455 Mujeres - 80 Hombres). Ver Gráfico 10.

Gráfica 10. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 39 Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

4.4 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 234 casos, seguido de abuso sexual con 222 casos, negligencia y abandono con 29 casos, violación con 21 casos, otras formas de violencia como acoso sexual, violencia psicológica, trata de personas con fines de explotación sexual, se encontraron en menos proporción como lo muestra la gráfica 4; en cuanto a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 39 casos, seguido de violencia física con 36 casos, abuso sexual con 14 casos, otros tipos de violencia que se presentaron para los hombres fueron acoso sexual con 3 casos, violación y violencia psicológica con 2 casos. Ver grafica 11.

Gráfica 11. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

4.5 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que “Ninguno” es la que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 31,8 % (mujeres n=171 y hombres n=31), seguido por pareja con 31,24 % (mujeres n=190 y hombres n=8), familiar con 14,6 % (mujeres n=79 y hombres n=14), Madre con 10,9 % (mujeres n=33 y hombres n=36), Expareja con 6,5 % (mujeres n=39 y hombres n=2), padre con 5,0 % (mujeres n=27 y hombres n=5), tal como se muestra en la gráfica 12.

Gráfica 12. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39 . Año 2018.

4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 57,5 %, seguido de contundentes/corto contundente con un 26,9 %, Otros mecanismos 6,3 %, Cortante/ corto punzante/Punzante con un 3,5 %, ahorcamiento con un 2,8 %, como se muestra en la gráfica13.



Gráfica 13. Violencia de género según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.

4.7 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presentan violencias con un 76,5 % (mujeres n= 417 y hombres n= 69); vía publica 9,1 % (mujeres n=46 y hombres n=12), otro con 6,1 % (mujeres n= 35 y hombres n=4), espacio terrestre al aire libre con 3,0 % (mujeres n=17 y hombre n=2), lugar de esparcimiento con expendido de alcohol con 2,0 % (mujeres n=10 y hombre n=3), seguido por otros escenarios tal como se muestra en la gráfica 14.



Gráfica 14. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 39. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 39. Año 2018.





CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: intento suicida, Violencia, para los eventos de trastornos mentales y consumo de SPA se emitirán a partir del siguiente boletín puesto que la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS; y hasta el momento no ha sido posible su recepción por un cambio de aplicativo que está realizando el instituto nacional de salud al programa SIVIGILA, por consiguiente al analizar el evento de Intento suicida y violencia en el departamento del Putumayo a semana epidemiológica 39 (1 de Enero al 29 de septiembre de 2018) se encontró lo siguiente:

✚ Con respecto a los trastornos mentales que más se presentan en el departamento del Putumayo relacionados con la guía MHGAP se encontró que trastornos mixto de ansiedad y depresión fue el trastorno mental con mayor número de casos, seguido de esquizofrenia, y episodio depresivo moderado, evidenciando que los rangos de edades con mayor predominio de estos son de, 15 a 19, 20-24 y de 25-29 años de edad

✚ Acerca de los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edad de mayor prevalencia en edades de 10-24 años de edad encontrándose sustancias como cannabinoides, cocaína, y el uso de múltiples drogas

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís, Mocoa, y Valle del Guamuéz, son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 39, el departamento presento 6.9 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 12.35 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 10.75 casos por 10.000 habitantes, Villagarzón con 10.75 casos por 10.000 habitantes, Colon con 10.65 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy 9.03 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 8.03 casos por 10.000 habitantes

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja, y de consumo de SPA, son los que mayor prevalencia tienen; en relación a presentar antecedentes de intentos suicidas conducta suicida con un 70 % (n=179) no tuvieron intentos previos, el 13% tuvieron 1 intentos previos, el 11.3% tuvieron dos intentos previos, tres intentos previos con 2.3 %, 2.7% cuatro intentos previos.





El análisis de la situación de las violencias de genero mencionado, indican que en el Departamento del Putumayo, se presentan todo tipo de violencia de acuerdo a la clasificación del Protocolo de Vigilancia en Salud Publica de Violencia de Genero

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Puerto Leguizamo, Sibundoy, Villagarzón, Moca y Puerto Guzmán, presentan mayor tasa de incidencia; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que **Ninguno**, es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 31,8 %, seguido por la pareja con 31,2 %, y familiar con 14,6%.

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores fueron elementos como: sin información 57,5 %, seguido de contundentes/cortocontundente con un 26,9 %, Otros mecanismos 6,3 %, Cortante/ corto punzante/Punzante con un 3,5 %ahorcamiento con un 2,8 %.

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 486 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 58 casos, y Otros con 39 casos.

