

# BOLETIN N° 27 SEMANA 13 DE 2019

TRANSTORNOS MENTALES- CONSUMO SPA- CONDUCTA SUICIDA-VIOLENCIA





**OBSERVATORIO**

**De salud mental Putumayo**

**[observatorio.smputumayo@hotmail.com](mailto:observatorio.smputumayo@hotmail.com)**

**Corte semana epidemiología 13, 2019 (1 de Enero a 30 de Marzo 2019)**

**Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental**

**Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública**





## TABLA DE CONTENIDO

1. TRASTORNO MENTAL.....	5
2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS .....	8
2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.....	8
3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019 .....	12
3.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	12
3.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO .	14
3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.....	14
3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO ...	15
3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENTES – SEXO .....	16
3.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA. ....	17
3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL. ....	17
4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019.....	18
4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA .....	18
4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019. ....	19
4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD .....	19
4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO Y ASEGURADORA.....	20
4.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO .....	21
4.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA .....	21
4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	22
4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	23
CONCLUSIONES .....	24

## LISTA DE GRAFICAS





Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019 ..... 5

Gráfica 2.Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte Marzo. Departamento del Putumayo..... 11

Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.. 13

Gráfica 4. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 13 .Departamento del Putumayo 2019. .... 15

Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019. .... 16

Gráfica 6. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 17

Gráfica 7.Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019. .... 19

Gráfica 8. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 20

Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana13. Departamento del Putumayo 2019..... 21

Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 22

Gráfica 11.Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 22

Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 23

## **LISTA DE MAPAS**

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019 ..... 9

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 12

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019..... 18





## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.....	5
Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.....	6
Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019. ....	6
Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2018.....	7
Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2018.....	9
Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019. ....	10
Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.....	14
Tabla 8. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019 .....	15
Tabla 9. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.....	17
Tabla 10. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.....	20






## 1. TRASTORNO MENTAL

En el periodo de enero a Marzo 2019, según información recopilada de fuentes como: RIPS y Observatorio de Salud Mental, con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 1011 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta ( desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia , trastorno por uso de alcohol , trastorno por uso de drogas, epilepsia y relacionados ; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales . Grafica N° 1

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo -Año 2019.

Al hacer referencia del número de casos presentado según municipio, se pudo encontrar que el municipio de Mocoa tuvo mayor número de casos con 2018 casos, seguido de Puerto Asís con 143 casos, Colon 104 casos, Valle del Guamuéz con 84 casos, Orito con 78 casos, Villagarzón con 64 casos, San Miguel con 55 casos, San Francisco 48, Santiago 38, Puerto Caicedo con 28 casos, Puerto Caicedo con 28 casos, Puerto Guzmán con 22 casos, Leguizamo con 20 casos como se encuentra relacionado en la gráfica número 1.

Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.

Etiquetas de fila	Mujeres	Hombres	Total general	%
Otros episodios depresivos	4		4	0,40%
Otros trastornos afectivos bipolares	6	1	7	0,69%
Trastorno depresivo recurrente	9	2	11	1,09%
Trastorno psicótico	2	12	14	1,38%
Episodio depresivo grave	19	6	25	2,47%
Episodio depresivo, no especificado	22	4	26	2,57%



<b>Demencia</b>	21	15	36	3,56%
<b>Episodio depresivo leve</b>	45	19	64	6,33%
<b>Sustancias psicoactivas</b>	20	71	91	9,00%
<b>Episodio depresivo moderado</b>	107	28	135	13,35%
<b>Trastorno de ansiedad</b>	85	55	140	13,85%
<b>Esquizofrenia</b>	88	106	194	19,19%
<b>Trastorno mixto de ansiedad y depresión</b>	184	80	264	26,11%
<b>Total general</b>	<b>612</b>	<b>399</b>	<b>1011</b>	<b>100%</b>

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo -Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales presentados en el departamento según sexo se encontró lo siguiente; con mayor proporción fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión con 26.11% (264 casos), seguido de esquizofrenia paranoide con 19.19% (194 casos), Trastorno de ansiedad 13.85% (140 caso), episodio depresivo moderado con 13.35% (135 casos), sustancias psicoactivas 9% (91 casos), episodio depresivo leve con 6.33% (64 casos), Demencia con 3.56% (36 casos), en menor proporción se encuentran episodio depresivo no especificado con 2.57% (26 casos), los demás trastornos mentales se encuentran en la tabla 1.

En cuanto al rango de edad, los grupos de mayor prevalencia fueron 10-19 años de edad con 22.06% (223 casos), 60 años y más con 17.3% (175 casos), 20-29 años de edad con 17.2% (174 casos). Los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2.

Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.

Etiquetas de fila	F	M	Total general
01-04		1	1
05-09	3	9	12
<b>10-19</b>	<b>130</b>	<b>93</b>	<b>223</b>
20-29	83	91	174
30-39	91	62	153
40-49	98	43	141
50-59	93	39	132
<b>60 y mas</b>	<b>114</b>	<b>61</b>	<b>175</b>
<b>Total general</b>	<b>612</b>	<b>399</b>	<b>1011</b>

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo -Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:

Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.

TRASTORNO MENTAL	10-19	20-29	60 y mas	Total general
Demencia			34	34
Episodio depresivo grave	8	5	4	17





Episodio depresivo leve	18	4	13	35
Episodio depresivo moderado	46	16	15	77
Episodio depresivo, no especificado	12	2	2	16
Esquizofrenia	10	41	28	79
Otros episodios depresivos	1	2	1	4
Otros trastornos afectivos bipolares		1		1
Sustancias psicoactivas	47	32		79
Trastorno de ansiedad	35	23	17	75
Trastorno depresivo recurrente	1	2	4	7
Trastorno mixto de ansiedad y depresión	43	38	56	137
Trastorno psicótico	2	8	1	11
<b>Total general</b>	<b>223</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>572</b>

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Octubre .Año 2018.

A nivel general se encontró que los trastornos mentales con mayor incidencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión, seguido de esquizofrenia y trastorno depresivo según los rangos de edad se encontraron:

- ✓ **10-19 años:** se encontraron 223 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron sustancias psicoactivas con 17 casos, seguido de episodio depresivo moderado con 46 casos, trastorno mixto y ansiedad con 43 casos.
- ✓ **20-29 años:** se encontraron 174 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; esquizofrenia con 41 casos, trastorno mixto de ansiedad y depresión con 38 casos, y sustancias psicoactivas con 32 casos.
- ✓ **60 años y más** se encontraron 175 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor incidencia; trastorno mixto de ansiedad y depresión con 56 casos, esquizofrenia con 28 casos, episodio depresivo moderado con 15 casos.

Los demás trastornos mentales relacionados en estos grupos de edad se encuentran en la tabla número 3.

Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2018.

EAPB	MUJERES	HOMBRES	Total general	%
Sin información	15	5	20	2%
Aic	65	51	116	11%
Asmet salud ess	2	2	4	0%
"Emssanar ess"	369	244	613	61%
Comfamiliar	1	1	2	0%
Comfaorien		1	1	0%



Coopsagar Ltda”	1		1	0%
Dirección departamental de salud de putumayo	3	5	8	1%
Mallamas	53	22	75	7%
magisterio	38	19	57	6%
Fuerzas militares	1	5	6	1%
La previsora s.a. Compañía de seguros	1		1	0%
Medimás eps s.a.s.	32	18	50	5%
Medimas subsidiado movilidad		1	1	0%
Nueva eps s.a.	24	21	45	4%
Policía nacional	6	4	10	1%
Susalud eps	1		1	0%
<b>Total general</b>	<b>612</b>	<b>399</b>	<b>1011</b>	<b>100%</b>

Fuente: RIPS y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Marzo .Año 2019.

Al observar los casos con trastornos mentales según EAPB a la cual se encuentran afiliados, se puede decir que EMSSANAR en la EAPB con mayor número de casos 613 (61%), seguido de AIC con 116 casos con trastornos mentales (11%), MALLAMAS con 75 casos (7%), y Magisterio con 57 casos (6%), medimas con 50 casos (5%), los demás casos relacionados se encuentran en la tabla 4.


## **2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

### **2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

Los trastorno mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 202 casos, según RIPS (corte octubre) en el departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 71% (145 casos) de trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y en las mujeres un 28% (57casos). Mapa 1.



Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo . Año 2019.

En cuanto al rango de edad, se encontró que los de mayor prevalencia se encontraron de 15-19 años con 41% (n=39), 20-24 años con 25%(n=24), 10-14 años con 10% (n=10). Los demás rangos de edad se encuentran la tabla número 5.

Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2018

Rango de edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
10-14	6	6,3%	4	4,2%	10	10%
15-19	7	7,3%	32	33,3%	39	41%
20-24	5	5,2%	19	19,8%	24	25%
25-29	3	3,1%	7	7,3%	10	10%
30-34		0,0%	5	5,2%	5	5%
35-39		0,0%	3	3,1%	3	3%
40-44	1	1,0%	1	1,0%	2	2%
45-49		0,0%	1	1,0%	1	1%
50-54		0,0%	2	2,1%	2	2%
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>22,9%</b>	<b>74</b>	<b>77,1%</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Marzo. Año 2019.





Al realizar una revisión de los diagnósticos del CIE10, se encontraron trastornos mentales y de comportamiento asociados al uso de: alucinógenos, cannabinoides, cocaína, múltiples drogas y alcohol; cuyas sustancias ocasionaron afecciones en las personas tipo: trastornos mentales y del comportamiento, intoxicación aguda, síndrome de dependencia, uso nocivo, estado de abstinencia, síndrome de dependencia, trastorno psicótico.

Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de **síndrome de dependencia** fue Cannabinoides con 14 casos, seguido de cocaína con 7 casos, y alcohol con 7 casos, en relación al **uso nocivo** fue cannabinoides con 8 casos cocaína con 4 casos, alcohol con 2 casos, **intoxicación aguda** múltiples drogas con 4 casos,. Como se encuentra relacionado en la tabla número 6

Tabla 6. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo .Corte Marzo. Departamento del Putumayo 2019.

TRASTORNO MENTAL ASOCIADO A SUSTANCIAS	Mujeres	Hombres	Total general		%
Desconocido	1	1	2	2	2,08%
Alucinógenos: estado de abstinencia con delirio		1	1	1	1,04%
Alucinógenos: intoxicación aguda		1	1	1	1,04%
Alucinógenos: otros trastornos mentales y del comportamiento		1	1	1	1,04%
Alucinógenos: trastorno mental y del comportamiento, no especificado		1	1	1	1,04%
Cannabinoides: estado de abstinencia		2	2	2	2,08%
Cannabinoides: intoxicación aguda		1	1	1	1,04%
Cannabinoides: otros trastornos mentales y del comportamiento		1	1	1	1,04%
Cannabinoides: síndrome de dependencia		14	14	14	14,58%
Cannabinoides: trastorno psicótico	3	4	7	7	7,29%
Cannabinoides: uso nocivo	3	5	8	8	8,33%
Cocaína: estado de abstinencia		1	1	1	1,04%
Cocaína: intoxicación aguda	1		1	1	1,04%
Cocaína: otros trastornos mentales y del comportamiento		2	2	2	2,08%
Cocaína: síndrome de dependencia	2	5	7	7	7,29%
Cocaína: uso nocivo	1	3	4	4	4,17%
Disolventes volátiles: otros trastornos mentales y del comportamiento		1	1	1	1,04%
Disolventes volátiles: síndrome de dependencia	3		3	3	3,13%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: estado de abstinencia		1	1	1	1,04%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: estado de abstinencia con delirio		1	1	1	1,04%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: intoxicación aguda		4	4	4	4,17%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: otros trastornos mentales y del comportamiento	2		2	2	2,08%





TRASTORNO MENTAL ASOCIADO A SUSTANCIAS	Mujeres	Hombres	Total general	%	
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: síndrome de dependencia	1	5	6	6	6,25%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno mental y del comportamiento, no especificado	2	4	6	6	6,25%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno psicótico		2	2	2	2,08%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: trastorno psicótico residual y de comienzo tardío		1	1	1	1,04%
Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: uso nocivo		2	2	2	2,08%
Opiáceos: trastorno mental y del comportamiento, no especificado		1	1	1	1,04%
Otros estimulantes, incluida la cafeína: intoxicación aguda	2		2	2	2,08%
Sedantes o hipnóticos: intoxicación aguda	1		1	1	1,04%
Alcohol: síndrome de dependencia		7	7	7	7,29%
Alcohol: uso nocivo		2	2	2	2,08%
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. corte Marzo. Año 2019.

En el caso de las EAPBs en las cuales se encuentran afiliados con mayor población se encuentra Emsanar con 58 casos equivalente a 60%, seguido de AIC 15 casos con 15.6%, Mallamas con 7 casos equivalente a 7.2% las demás EAPB se encuentra en la gráfica 2.

Gráfica 2. Trastornos mentales según afiliación a EAPB. Corte Marzo. Departamento del Putumayo



Fuente: RIPS- Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo Marzo, Año 2019.





### 3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019

#### 3.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 13 del año 2019) con registro de las siguientes IPS del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 88 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Mocoa 16 casos, Puerto Asís 13 casos, Colon, 12, Orito 11 casos, Puerto Leguizamo 9 casos, Valle del Guamuez 8 casos, Villagarzón 7 casos, Puerto Caicedo 4 casos, Puerto Guzmán 3 casos, San Miguel ( la Dorada ) 3 casos, Santiago 1 caso, Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13 . Año 2019.






**Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:**

Que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 58.6 casos por 100.000 habitantes, Sibundoy con 41.4 casos por 100.000 habitantes, Mocoa con 35.1 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 33.8 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 32.5 casos por 100.000 habitantes, San Francisco con 27.7 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 27.5 casos por 100.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 24.2 casos por 100.000 habitantes, Por debajo del departamento se encuentra, Puerto Asís con 20.6 casos por 100.000 habitantes, Orito 19 casos por 100.000 habitantes, Colon con 17.5 casos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 12.9 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán 12.3 casos por 100.000 habitantes, San Miguel 10.4 casos por 100.000 habitantes como lo muestra la gráfica Numero 3.

Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13 . Año 2019





### 3.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

#### 3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 13, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: mujeres 53 casos para un equivalente de 60.2% en mujeres y en hombres 35 casos para un equivalente de 39.7%

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, los grupos etarios donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;

Al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 11 casos (13%), de 15-19 años de edad con unos 21 casos (24%), de 20-24 años de edad con 5 casos (6%).

En relación a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 20-24 años de edad con 11 casos (13%), 15-19 años con 8 casos (13%), de 25-29 años con 5 casos (6%). Ver tabla Numero 7.

Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.


Rango_edad_	Mujeres	%	Hombres	%	Total general	%
10-14	11	13%	1	1%	12	14%
15-19	21	24%	8	9%	29	33%
20-24	5	6%	11	13%	16	18%
25-29	7	8%	5	6%	12	14%
30-34	3	3%	3	3%	6	7%
35-39	2	2%	2	2%	4	5%
40-44	3	3%	3	3%	6	7%
45-49		0%	1	1%	1	1%
55-59		0%	1	1%	1	1%
70-74	1	1%		0%	1	1%
<b>Total general</b>	<b>53</b>	<b>60%</b>	<b>35</b>	<b>40%</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13 . Año 2019.

De los 88 casos reportados el 66% (n=58) no tuvieron intentos previos, el 1% (n= 1) tuvieron 4 intentos previos (hombres n=1), el 3% (n= 3) tuvieron 3 intentos previos (mujeres n=3), 2 intentos previos con 16% (n=14) (hombres n= 4y mujeres n= 10), 10% (n=9) 1 intentos previos (mujeres n=2 y hombres n=7) como lo muestra la gráfica número 4.



Gráfica 4. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 13 .Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

### 3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 9 indígenas, de las cuales son 3 mujer y 6 hombres, en relación a la aseguradora a la cual se encuentran afiliados, AIC fue la asegura con más casos relacionados, presentándose 5 casos, para Emssanar, Mallamas, otras EAPB, se presentó un caso para cada una; población Rom se presentó 1 caso con Emssanar, en relación a los Afrocolombianos se encontraron 1 caso, de los cuales se presentó en 1 hombre, con Aseguradora en Emssanar; y en otros 77 casos de los cuales 49 fueron mujeres y 28 fueron hombres, en relación a la aseguradora con más usuarios reportados fue Emssanar con 43 casos, seguido de AIC con 10 casos, Medimas con 6 y Mallamas 5 y fuerzas militares 3 casos para cada aseguradora. Ver tabla número 8.

Tabla 8. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019

Partencia étnica	EAPB	mujeres	hombres	Total general
Indígena	AIC	1	4	5
	sin dato	0	1	1
	Otras	0	1	1
	Emssanar	1	0	1
	Mallamas	1	0	1
<b>Total Indígena</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Rom	Emssanar	0	1	1
<b>Total Rom</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Afrocolombiano	Emssanar	1	0	1
<b>Total Afrocolombiano</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
otro	AIC	6	4	10
	sin dato	1	3	4





Otras	1	0	1
Emssanar	26	17	43
Departamento	0	1	1
Medimas	6	0	6
Mallamas	4	1	5
Ecopetrol	0	1	1
Unimap	1	0	1
Cruz Blanca	1	0	1
Fuerzas militares	2	1	3
Asmetsalud	1	0	1
<b>Total otro</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>77</b>
<b>Total general</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>88</b>


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

### 3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 50% (mujeres n=24, hombres n=19), seguido de problemas económicos con 13% (mujeres n=6, hombres n= 5), maltrato físico con 9% (mujeres n=5, hombres n=3), problemas económicos con 13% (mujeres n=6, hombres n=5), como lo muestra en la .Grafica 5.

Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.





### 3.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 88 casos, 14 (15%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental relacionado a trastorno depresivo 11 casos (12 %); seguido de trastorno de personalidad con 2 (2.2%), trastorno bipolar con 1 caso (1.4%), como lo muestra la tabla número 9.

Tabla 9. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.


Trastorno psiquiátrico	Mujeres	Hombres	Total general
Trastornos depresivos	5	6	11
Trastorno bipolar	1	0	1
trastornos de personalidad	1	1	2

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

### 3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANICANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 13 de 2019 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 76.6% (mujeres n=44 hombres n=23), arma corto punzante con 19.3% (mujeres n=7, hombres n=10), lanzamiento a Vehículo con 1.1% (hombres n=1), arma de fuego con 1.1%. Ver grafica número 6.

Gráfica 6. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.






#### 4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019

##### 4.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 13 año 2019, se encuentran 193 casos; de los cuales 3 casos son de residencia de otros Departamentos; los eventos con residencia en el Departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Puerto Asís con 30 casos, Valle del Guamuéz con 28 casos, Mocoa con 27 casos, Sibundoy con 22 casos, Puerto Guzmán con 20 casos, Puerto Leguizamo con 16 casos, Villagarzón con 14 casos, Orito con 6 casos, Puerto Caicedo con 6 casos, Colon, San Francisco, San Miguel con 4 casos cada municipio, Santiago con 2 casos; municipio desconocido del departamento del Putumayo 1 caso, Ver Mapa 3.

Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019


Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que el municipio de Colon fué el que tuvo la incidencia más alta a corte semana 13 de 2019, con 543 casos nuevos por 100.000 habitantes, seguido de Puerto Leguizamo con 104 casos nuevos por 100.000 habitantes, Mocoa con 65 casos nuevos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 60 casos nuevos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 55 casos



nuevos por 100.000 habitantes, los cuales se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual está en 53 casos nuevos por 100.000 habitantes corte semana 13 del año en curso, por debajo de la incidencia departamental se encuentra Puerto Asís con 46 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 40 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 32 casos nuevos por 100.000 habitantes, Oríto, Sibundoy y San Miguel con 13 casos por 100.000 habitantes para cada municipio; Ver gráfica 7.

Gráfica 7. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

## 4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019.

### 4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD


De los 193 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 81% (n=157) fueron Mujeres y el 19% (n=36) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 15 casos, de 5-9 años con 5 casos y de 15-19 años con 4 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años con 32 casos, 20-24 años con 24 casos, 25-29 años con 17 casos; Los demás rangos se evidencian en la Grafica 8.



Gráfica 8. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019

#### 4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO Y ASEGURADORA.

En cuanto a la pertenencia étnica se encuentra, que el 8,4% son indígenas (11 Mujeres – 4 Hombres) y 92,2 % otros (146Mujeres - 32Hombres), en relación a la aseguradora a la cual pertenecen por etnia, se encontró que los indígenas se encuentran con mayor afiliación a AIC con el 60%, seguido de Mallamas con 27%, en relación a otros, se encontró que la aseguradora con mayor población fue Emssanar con 62%, seguido de AIC con 10%, Mallamas 6%, las demás aseguradoras se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.

Etnia	aseguradora	Mujeres	Hombres	Total general	%
Indígena	AIC	8	1	9	60%
	Asmetsalud	1	0	1	7%
	Fuerzas Militares	0	1	1	7%
	Mallamas	2	2	4	27%
<b>Total Indígena</b>		<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
Otro	AIC	17	1	18	10%
	Asmetsalud	1	0	1	1%
	capital Salud	2	0	2	1%
	comfamiliar	2	0	2	1%
	Cooperativa salud	1	0	1	1%
	Emssanar	90	21	111	62%
	Fuerzas Militares	2	0	2	1%
	Indeterminado	2	0	2	1%






Etnia	aseguradora	Mujeres	Hombres	Total general	%
	Mallamas	8	2	10	6%
	Medimas	10	2	12	7%
	No Asegurado	6	5	11	6%
	Nueva Eps	2	0	2	1%
	Policía	0	1	1	1%
	Sanitas	1	0	1	1%
	Unimap	2	0	2	1%
<b>Total Otros</b>		<b>146</b>	<b>32</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13 . Año 2019.

### 4.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 73 casos, seguido de abuso sexual con 56 casos, negligencia y abandono con 10 casos y 9 casos con Violación, en relación a los hombres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 15 casos, violencia física con 14 casos, abuso sexual con 5 casos. Ver grafica 9.

Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

### 4.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que “Pareja” es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 30,1 % (mujeres n=5 y hombres n=3), seguido por ninguno con 24,4 % (mujeres n=41 y hombres n=6), familiar con 18,7 % (mujeres n=28 y hombres n=8), Madre con 14,0 % (mujeres n=11 y hombres n=16), Expareja con 10,4 % (mujeres n=18 y



hombres n=2), padre con 2,6 % (mujeres n=4 y hombres n=1), tal como se muestra en la gráfica 10.

Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.

#### 4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 54,9 %, seguido de contundente/corto contundente con 33,7 %, Otros mecanismos con 5,7 %, ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación y Cortante/corto punzante/Punzante ambos con 2,1 %, caídas con 1,0 %, como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11. Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.






#### 4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presentan violencias con un 70,5 % (mujeres n= 111 y hombres n= 25); vía pública 11,9 % (mujeres n=20 y hombres n=3), otro con 7,8 % (mujeres n=13 y hombres n=2), espacio terrestre al aire libre con 3,6 % (mujeres n=4 y hombre n=3), lugar de esparcimiento con expendido de alcohol con 2,1 % (mujeres n=2 y hombre n=2), centros educativos con 2,1 % (mujeres n=2 y hombres n=2) tal como se muestra en la gráfica 12.

Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 13. Año 2019.





## CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, intento suicida, Violencia; la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS corte Marzo y SIVIGILA, corte semana 13 (1 de Enero al 30 de Marzo 2019) se encontró lo siguiente:

- ✚ Los cinco trastornos con mayor morbilidad en el departamento del Putumayo con corte marzo, se encuentra es el trastorno mixto de ansiedad y depresión, Esquizofrenia, trastorno de ansiedad, episodio depresivo moderado y por consumo de sustancias psicoactivas.
- ✚ En relación a los municipios con mayor número de casos se encuentran, Mocoa con 218 casos, Puerto Asís con 143 casos, Colon y Sibundoy con 104 casos, en cuanto al rango de edad que más casos se presenta es el de 10- 19 años de edad, seguido de 60 años y más, de 20 a 29 años de edad.
- ✚ Al realizar Las cifras sustancias psicoactivas se encontró que se presentaron mayores cifras por consulta de trastornos mentales asociados a sustancias psicoactivas en las IPS del departamento fueron Mocoa, Colon, Puerto Asís, y Orito; en cuanto a las edades de mayor número de casos se presentó fue de 15- 19 años, seguido de 20-24 años, y de 10- 14 años junto con 25-29 años.
- ✚ Al analizar a detalle se encontró que las sustancias psicoactivas causantes de más casos de síndrome de dependencia fue Cannabinoides con 14 casos, seguido de cocaína con 7 casos, y alcohol con 7 casos, en relación al uso nocivo fue cannabinoides con 8 casos cocaína con 4 casos, alcohol con 2 casos, intoxicación aguda múltiples drogas con 4 casos.
- ✚ En cuanto a intencionalidad suicida se encontró que se muestran con tendencias crecientes en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, y Orito, son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 13, Que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 58.6 casos por 100.000 habitantes, Sibundoy con 41.4 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 35.1 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 33.8 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 32.5 casos por 100.000 habitantes, San Francisco con 27.7 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 27.5 casos por 100.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 24.2 casos por 100.000 habitantes, Por debajo del departamento se encuentra, Puerto Asís con 20.6 casos por 100.000 habitantes, Orito 19 casos por 100.000 habitantes, Colon con 17.5 casos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 12.9 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán 12.3 casos por 100.000 habitantes, San Miguel 10.4 casos por 100.000 habitantes.
- ✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 19 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.





- + De los intentos presentados el 32.95% (29 casos) tenía historial de intentos suicida que oscilaron entre 1 intento y hasta 4 intentos o más, y el 66 % (58 casos) no presentaron historial de intentos suicidas a lo largo de su vida.
- + De los factores desencadenantes para intencionalidad suicida se encontró que los problemas de pareja fue el factor con mayor número de casos se presentó n=43 casos, (49%), seguido de problemas económicos con 18 casos (20%), seguido de maltrato físico con 8 casos (9%).
- + En relación a Violencia de genero se encontró que los Municipios que muestran cifras de tendencias crecientes son: Sibundoy, Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa, Valle del Guamuez, su tasa de incidencia está por encima de la del Departamento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.
- + Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que la **Pareja**, es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 30 %, seguido por ninguno con 24,4 %, y familiar con 18,7 %.
- + Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores en primer lugar se encuentran elementos como: sin información con un 54,9 %, seguido de contundente/cortocontundente con un 33,7 %, Otros mecanismos 5,7 %, Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación y Cortante/ corto punzante/Punzante ambos con un 2,1 %, caídas con un 1,0 % y proyectil por arma de fuego 0,5% .
- + En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 136 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública con 23 casos, y Otro con 7 casos.

